

It is not Higgs

G. A. Quznetsov

email: gunn@chelcom.ru, lak@cgu.chel.su, gunn@mail.ru

Abstract

Every physics event is interpreted by particles which similar well-known elementary particles - leptons, quarks and gauge bozons. Therefore, if anybody will claim that he had found Higgs then not believe - this is not Higgs.

Это не Хиггсы

Г. А. Кузнецов (G. A. Quznetsov)
email: gunn@chelcom.ru, lak@cgu.chel.su, gunn@mail.ru

Аннотация

Любое физическое событие интерпретируется частицами, аналогичными известным элементарным частицам - лептонам, кваркам и калибровочным бозонам. Поэтому, если кто-нибудь будет утверждать, что он нашел Хиггсы, не верьте - это не Хиггсы.

"... Они пилили гири
— Что такое ! — сказал вдруг Балаганов, переставая работать, — Три часа уже пило, а оно все еще не золотое. Паниковский не ответил. Он уже все понял и последние полчаса водил ножовкой только для виду.
— Ну-с, попилим еще ! бодро сказал рыжеволосый Шура.
— Конечно, надо пилить, - заметил Паниковский, стараясь оттянуть страшный час расплаты."
Илья Ильф и Евгений Петров "Золотой Теленок"
<http://www.lib.ru/ILFPETROV/telenok.txt>

1 Введение

Далее все (если специально не оговаривается) происходит в координатной системе $R^{\mu+1}(t, x_1, x_2, \dots, x_\mu)$.

Обозначим:

$$\begin{aligned}\mathbf{x} &\stackrel{def}{=} (x_1, x_2, \dots, x_\mu), \\ \underline{x} &\stackrel{def}{=} \langle t, \mathbf{x} \rangle, \\ \int d^{\mu+1}\underline{x} &\stackrel{def}{=} \int dt \int dx_1 \int dx_2 \cdots \int dx_\mu, \\ \int d^\mu \mathbf{y} &\stackrel{def}{=} \int_{-\infty}^{\infty} dy_1 \int_{-\infty}^{\infty} dy_2 \cdots \int_{-\infty}^{\infty} dy_\mu.\end{aligned}$$

События, выражаемые предложениями вида «В момент t A имеет координаты $\mathbf{x}$ » я обозначаю как $A(t, \mathbf{x})$ и называю *точечными событиями*. А ансамбли точечных событий - *физическими событиями*.

$A(D)$ означает $(A(t, \mathbf{x}) \& \ll (t, \mathbf{x}) \in D \gg)$.

В этой статье основные понятия и соотношения квантовой теории представляются как понятия и отношения той части теории вероятности, которая относится к точечным событиям в пространстве-времени [1]:

Во второй части этой статьи вероятности, связывающие точечные события, выражаются спинорными функциями и *операторами рождения и уничтожения вероятностей*, аналогичными полевым операторам квантовой теории поля. Здесь же определяется понятие клиффордового множества матриц, в частности - понятие легкой клиффордовой пентады, понятие цветных и вкусовых клиффордовых пентад ¹, и для спинорных функций получаются уравнения движения в форме

¹В частях 2-6 рассматриваются уравнения движения, содержащие только элементы легкой пентады. Такие уравнения здесь называются *лептонными*.

уравнений Дирака с дополнительными полями, одни из которых образуют массовые члены, а другие ведут себя как калибровочные поля.

В уравнение Дирака входят только четыре элемента пентады Клиффорда. Три из этих элементов соответствуют трем пространственным координатам, а четвертая - или образует массовый член, или соответствует четвертой - временной - координате.

Но пентада Клиффорда содержит пять элементов. Повидимому есть смысл дополнить уравнение Дирака еще одним массовым членом с пятым элементом пентады. То есть массовая часть уравнения Дирака будет содержать два члена. Более того, если этим двум массовым членам клиффордовой пентады поставить в соответствие две дополнительных квазипространственных координаты, то получится однородное уравнение Дирака, в которое все пять элементов клиффордовой пентады и все пять пространственных координат входят одинаковым образом. В таком пятимерном пространстве все локальные скорости по модулю равны единице.

В третьей части показано, что переопределенное подобным образом уравнение движения инвариантно относительно поворотов в 2-пространстве четвертой и пятой координат. Это преобразование определяет поле, аналогичное B -бозонному полю.

В четвертой части определяется понятие, соответствующее квантово-теоретическому понятию массы:

Так как значения вероятностей не определяются абсолютно точно, то дополнительные поля, образующие массовые члены представимы достаточно тонкими слоями. А величины тех двух пространственных координат, которые вводятся для однородности массовых членов, можно ограничить большим числом без ограничения общности. В этом случае спектр масс получается дискретным, и в каждой точке $3+1$ пространства-времени либо находится только одна масса, либо эта точка пустая.

Масса представлена квадратным корнем из суммы квадратов двух целых чисел:

$$m_0 = \sqrt{n_0^2 + s_0^2}$$

из двух массовых членов уравнения движения. Но это уравнение инвариантно относительно поворотов в 2-пространстве четвертой и пятой координаты. То есть масса сама должна быть выражена натуральным числом, и числа в массовых членах должны оставаться целыми при поворотах.

Следовательно, масса и составляющие ее числа массовых членов должны составлять пифагорову тройку $\langle m_0; n_0, s_0 \rangle$ [2]. Здесь m_0 называется *отцом* тройки. При поворотах в 2-пространстве четвертой и пятой координаты одна пифагорова тройка должна заменяться на другую с тем же самым отцом. То есть для заданной точности определения угла поворота должно существовать такое

семейство пифагоровых троек с одним и тем же отцом, что при повороте на этот угол одна тройка семейства заменяется другой тройкой из этого же семейства. Для любой точности определения углов поворотов в дальних частях натурального ряда существуют отцы, обеспечивающие такую точность. Я полагаю, что эти семейства пифагоровых троек соответствуют семействам элементарных частиц.

В пятой части операторы рождения и уничтожения частиц определяются как Фурье-преобразования соответствующих операторов вероятности, а античастицы - стандартным образом.

В шестой части рассматриваются все унитарные преобразования на двух-массовых функциях, сохраняющие 4-вектор тока вероятности. Среди таких преобразований есть соответствующие электрослабым калибровочным полям. Эти электрослабые унитарные преобразования тоже выражаются поворотами в 2-пространстве четвертой и пятой пространственных координат. Частицы, аналогичные нейтрино (*нейтринно*), появляются в результате таких преобразований. *Нейтринно* оказываются существенно связанными со своими *лептоннами*.

Уравнения движения инвариантны относительно этих преобразований, и в результате получаются поля, аналогичные W -бозонным. Безмассовое поле

$$F_{\mu,\nu} = \partial_\mu W_\nu - \partial_\nu W_\mu - i\frac{g_2}{2}(W_\mu W_\nu - W_\nu W_\mu)$$

вводится обычным образом, но при решении уравнений Эйлера-Лагранжа получается, что хотя $F_{\mu,\nu}$ безмассовое, его образующие W_μ локально ведут себя как массивные поля.

Безмассовое поле A и массивное поле Z определяются стандартным образом по полям B и W .

В седьмой части показано, что лептонное уравнение движения инвариантно относительно поворотов в 3-пространстве первых обычных пространственных координат и лоренцевых поворотов в 3+1 пространстве-времени. Уравнения движения, составленные элементами цветных пентад, при таких поворотах перемешиваются между собой. То есть частицы, соответствующие пентадам разных цветов, неразделимы в пространстве и времени (конфайнмент). Таких частиц в семействе два сорта по три цвета - всего шесть. Я называю их *кваррками*.

В восьмой части показано, что для вкусовых пентад в нынешней квантовой теории нет применения.

В девятой части рассматривается ситуация с парой точечных событий и etc.

В десятой части устанавливается соответствие между линейным пространством спиноров и нормированной алгеброй с делением и на основании теорем Гурвица и Фробениуса [3], [4] получается вывод о размерности пространства точечных событий.

В одиннадцатой части развивается идея (Bergson [5], Whitehead [6], Capek [7], [8], Whipple jr. [9] and J. Jeans [10]) интерпретации квантовой теории событиями.

2 События и уравнения движения

Пусть P - классическая функция вероятности.

Я называю *абсолютной плотностью* вероятности события A функцию $p_A(\underline{x})$ такую, что для любой области D : если $D \subseteq R^{\mu+1}$, то

$$\int_D d^{\mu+1} \underline{x} \cdot p_A(\underline{x}) = P(A(D)).$$

Если J - якобиан преобразований

$$\begin{aligned} t &\rightarrow t' = \frac{t - vx_k}{\sqrt{1 - v^2}}, \\ x_k &\rightarrow x'_k = \frac{x_k - vt}{\sqrt{1 - v^2}}, \\ x_j &\rightarrow x'_j = x_j \text{ для } j \neq k, \end{aligned} \tag{1}$$

то

$$J = \frac{\partial(t', x')}{\partial(t, x)} = 1.$$

Поэтому абсолютная плотность вероятности инвариантна относительно преобразований Лоренца.

Если

$$\rho_A(t, \mathbf{x}) = \frac{p_A(t, \mathbf{x})}{\int d^\mu \mathbf{y} \cdot p_A(t, \mathbf{y})},$$

то $\rho_A(t, \mathbf{x})$ представляет *плотность распределения* вероятности A в момент t .

В преобразованиях (1):

$$\rho_A(t, \mathbf{x}) \rightarrow \rho'_A(t, \mathbf{x}) = \frac{p_A(t, \mathbf{x})}{\int d^\mu \mathbf{y} \cdot p_A(t + v(y_k - x_k), \mathbf{y})}.$$

Следовательно, ρ_A не инвариантна относительно этих преобразований.

Далее я рассматриваю события $A(\underline{x})$, для которых ρ_A представляет нулевую компоненту некоторого $3 + 1$ -векторного поля $\underline{j}_A$

$$(\underline{j}_A = (j_{A,0}, \mathbf{j}_A) = (j_{A,0}, j_{A,1}, j_{A,2}, \dots, j_{A,\mu})).$$

То есть найдутся вещественные функции $j_{A,k}(\underline{x})$ такие, что:

$$\rho_A = j_{A,0}$$

и в преобразованиях (1):

$$\begin{aligned} j_{A,0} &\rightarrow j'_{A,0} = \frac{j_{A,0} - v j_{A,k}}{\sqrt{1-v^2}}, \\ j_{A,k} &\rightarrow j'_{A,k} = \frac{j_{A,k} - v j_{A,0}}{\sqrt{1-v^2}}, \\ j_{A,s} &\rightarrow j'_{A,s} = j_{A,s} \text{ для } s \neq k. \end{aligned}$$

Обозначим:

$$1_2 \stackrel{def}{=} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, 0_2 \stackrel{def}{=} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \beta^{[0]} \stackrel{def}{=} - \begin{bmatrix} 1_2 & 0_2 \\ 0_2 & 1_2 \end{bmatrix}.$$

матрицы Паули:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Множество $\tilde{C}$ комплексных $n \times n$ матриц называется *Клиффордовым множеством ранга n* [11] если выполняются следующие условия:

если $\alpha_k \in \tilde{C}$ и $\alpha_r \in \tilde{C}$, то $\alpha_k \alpha_r + \alpha_r \alpha_k = 2\delta_{k,r}$;

если $\alpha_k \alpha_r + \alpha_r \alpha_k = 2\delta_{k,r}$ для всех элементов α_r множества $\tilde{C}$, то $\alpha_k \in \tilde{C}$.

Далее до специальной отметки пусть $\mu = 3$.

Если $n = 4$, то Клиффордово множество либо содержит 3 матрицы (*Клиффордова тройка*), либо - 5 матриц (*Клиффордова пентада*).

Существует только шесть Клиффордовых пентад [11]: одна *легкая пентада* β :

$$\beta^{[1]} \stackrel{def}{=} \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0_2 \\ 0_2 & -\sigma_1 \end{bmatrix}, \beta^{[2]} \stackrel{def}{=} \begin{bmatrix} \sigma_2 & 0_2 \\ 0_2 & -\sigma_2 \end{bmatrix}, \beta^{[3]} \stackrel{def}{=} \begin{bmatrix} \sigma_3 & 0_2 \\ 0_2 & -\sigma_3 \end{bmatrix}, \quad (2)$$

$$\gamma^{[0]} \stackrel{def}{=} \begin{bmatrix} 0_2 & 1_2 \\ 1_2 & 0_2 \end{bmatrix}, \quad (3)$$

$$\beta^{[4]} \stackrel{def}{=} i \cdot \begin{bmatrix} 0_2 & 1_2 \\ -1_2 & 0_2 \end{bmatrix}; \quad (4)$$

три *цветных* пентады:

красная пентада ζ :

$$\zeta^{[1]} = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0_2 \\ 0_2 & -\sigma_1 \end{bmatrix}, \zeta^{[2]} = \begin{bmatrix} \sigma_2 & 0_2 \\ 0_2 & \sigma_2 \end{bmatrix}, \zeta^{[3]} = \begin{bmatrix} -\sigma_3 & 0_2 \\ 0_2 & -\sigma_3 \end{bmatrix},$$

$$\gamma_\zeta^{[0]} = \begin{bmatrix} 0_2 & -\sigma_1 \\ -\sigma_1 & 0_2 \end{bmatrix}, \zeta^{[4]} = -i \begin{bmatrix} 0_2 & \sigma_1 \\ -\sigma_1 & 0_2 \end{bmatrix};$$

зеленая пентада η :

$$\eta^{[1]} = \begin{bmatrix} -\sigma_1 & 0_2 \\ 0_2 & -\sigma_1 \end{bmatrix}, \eta^{[2]} = \begin{bmatrix} \sigma_2 & 0_2 \\ 0_2 & -\sigma_2 \end{bmatrix}, \eta^{[3]} = \begin{bmatrix} -\sigma_3 & 0_2 \\ 0_2 & -\sigma_3 \end{bmatrix},$$

$$\gamma_\eta^{[0]} = \begin{bmatrix} 0_2 & -\sigma_2 \\ -\sigma_2 & 0_2 \end{bmatrix}, \eta^{[4]} = i \begin{bmatrix} 0_2 & \sigma_2 \\ -\sigma_2 & 0_2 \end{bmatrix};$$

синяя пентада θ :

$$\theta^{[1]} = \begin{bmatrix} -\sigma_1 & 0_2 \\ 0_2 & -\sigma_1 \end{bmatrix}, \theta^{[2]} = \begin{bmatrix} \sigma_2 & 0_2 \\ 0_2 & \sigma_2 \end{bmatrix}, \theta^{[3]} = \begin{bmatrix} \sigma_3 & 0_2 \\ 0_2 & -\sigma_3 \end{bmatrix},$$

$$\gamma_\theta^{[0]} = \begin{bmatrix} 0_2 & -\sigma_3 \\ -\sigma_3 & 0_2 \end{bmatrix}, \theta^{[4]} = -i \begin{bmatrix} 0_2 & \sigma_3 \\ -\sigma_3 & 0_2 \end{bmatrix};$$

две *вкусовые* пентады:

сладкая пентада $\underline{\Delta}$:

$$\underline{\Delta}^{[1]} = \begin{bmatrix} 0_2 & -\sigma_1 \\ -\sigma_1 & 0_2 \end{bmatrix}, \underline{\Delta}^{[2]} = \begin{bmatrix} 0_2 & -\sigma_2 \\ -\sigma_2 & 0_2 \end{bmatrix}, \underline{\Delta}^{[3]} = \begin{bmatrix} 0_2 & -\sigma_3 \\ -\sigma_3 & 0_2 \end{bmatrix},$$

$$\underline{\Delta}^{[0]} = \begin{bmatrix} -1_2 & 0_2 \\ 0_2 & 1_2 \end{bmatrix}, \underline{\Delta}^{[4]} = i \begin{bmatrix} 0_2 & 1_2 \\ -1_2 & 0_2 \end{bmatrix};$$

горькая пентада $\underline{\Gamma}$:

$$\underline{\Gamma}^{[1]} = i \begin{bmatrix} 0_2 & -\sigma_1 \\ \sigma_1 & 0_2 \end{bmatrix}, \underline{\Gamma}^{[2]} = i \begin{bmatrix} 0_2 & -\sigma_2 \\ \sigma_2 & 0_2 \end{bmatrix}, \underline{\Gamma}^{[3]} = i \begin{bmatrix} 0_2 & -\sigma_3 \\ \sigma_3 & 0_2 \end{bmatrix},$$

$$\underline{\Gamma}^{[0]} = \begin{bmatrix} -1_2 & 0_2 \\ 0_2 & 1_2 \end{bmatrix}, \underline{\Gamma}^{[4]} = \begin{bmatrix} 0_2 & 1_2 \\ 1_2 & 0_2 \end{bmatrix}.$$

Так как следующая система четырех вещественных уравнений с восемью вещественными неизвестными: b^2 , при $b > 0$, $\overset{*}{\alpha}$, $\overset{*}{\beta}$, $\overset{*}{\chi}$, $\overset{*}{\theta}$, $\overset{*}{\gamma}$, $\overset{*}{v}$, $\overset{*}{\lambda}$

$$\left\{ \begin{array}{l} b^2 = -\rho_A, \\ b^2 \begin{pmatrix} \cos^2(\overset{*}{\alpha}) \sin(2\overset{*}{\beta}) \cos(\overset{*}{\theta} - \overset{*}{\gamma}) - \\ -\sin^2(\overset{*}{\alpha}) \sin(2\overset{*}{\chi}) \cos(\overset{*}{v} - \overset{*}{\lambda}) \end{pmatrix} = -j_{A,1}, \\ b^2 \begin{pmatrix} \cos^2(\overset{*}{\alpha}) \sin(2\overset{*}{\beta}) \sin(\overset{*}{\theta} - \overset{*}{\gamma}) - \\ -\sin^2(\overset{*}{\alpha}) \sin(2\overset{*}{\chi}) \sin(\overset{*}{v} - \overset{*}{\lambda}) \end{pmatrix} = -j_{A,2}, \\ b^2 \left(\cos^2(\overset{*}{\alpha}) \cos(2\overset{*}{\beta}) - \sin^2(\overset{*}{\alpha}) \cos(2\overset{*}{\chi}) \right) = -j_{A,3}. \end{array} \right. \quad (5)$$

имеет решения для любых ρ_A и $j_{A,k}$, то при

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= b \exp(i \overset{*}{\gamma}) \cos(\overset{*}{\beta}) \cos(\overset{*}{\alpha}), \\ \varphi_2 &= b \exp(i \overset{*}{\theta}) \sin(\overset{*}{\beta}) \cos(\overset{*}{\alpha}), \\ \varphi_3 &= b \exp(i \overset{*}{\lambda}) \cos(\overset{*}{\chi}) \sin(\overset{*}{\alpha}), \\ \varphi_4 &= b \exp(i \overset{*}{v}) \sin(\overset{*}{\chi}) \sin(\overset{*}{\alpha}) \end{aligned}$$

$$j_{A,\alpha} \stackrel{def}{=} - \sum_{k=1}^4 \sum_{s=1}^4 \varphi_s^* \beta_{s,k}^{[\alpha]} \varphi_k \quad (6)$$

с $\alpha \in \{0, 1, 2, 3\}$.

Если 3-вектор $\mathbf{u}_A$ определяется как

$$\mathbf{j}_A \stackrel{def}{=} \rho_A \mathbf{u}_A, \quad (7)$$

то $\mathbf{u}_A$ представляет *локальную скорость распространения вероятности события A*.

Обозначим:

$$\begin{aligned}
\partial_k &\stackrel{Def}{=} \partial/\partial x_k; \\
\partial_t &\stackrel{Def}{=} \partial_0 \stackrel{Def}{=} \partial/\partial t; \\
\partial'_k &\stackrel{Def}{=} \partial/\partial x'_k; \\
\sum_{\mathbf{k}} &\stackrel{Def}{=} \sum_{k_1=-\infty}^{\infty} \sum_{k_2=-\infty}^{\infty} \sum_{k_3=-\infty}^{\infty} .
\end{aligned}$$

Я рассматриваю события, подчиняющиеся следующим условиям: существует крошечное вещественное положительное число h такое, что если $|x_r| \geq \frac{\pi}{h}$ ($r \in \{1, 2, 3\}$), то

$$\varphi_j(t, \mathbf{x}) = 0.$$

Пусть (V) - область, для которой: $\mathbf{x} \in (V)$, если и только если $|x_r| \leq \frac{\pi}{h}$ для $r \in \{1, 2, 3\}$. То есть:

$$\int_{(V)} d^3\mathbf{x} = \int_{-\frac{\pi}{h}}^{\frac{\pi}{h}} dx_1 \int_{-\frac{\pi}{h}}^{\frac{\pi}{h}} dx_2 \int_{-\frac{\pi}{h}}^{\frac{\pi}{h}} dx_3.$$

Пусть $j \in \{1, 2, 3, 4\}$, $k \in \{1, 2, 3, 4\}$

Если

$$\varsigma_{w, \mathbf{p}}(t, \mathbf{x}) \stackrel{def}{=} \exp(ih(wt - \mathbf{p}\mathbf{x})),$$

то ряд Фурье для $\varphi_j(t, \mathbf{x})$ имеет следующую форму:

$$\varphi_j(t, \mathbf{x}) = \sum_{w, \mathbf{p}} c_{j, w, \mathbf{p}} \varsigma_{w, \mathbf{p}}(t, \mathbf{x}).$$

Обозначим: $\varphi_{j, w, \mathbf{p}}(t, \mathbf{x}) \stackrel{def}{=} c_{j, w, \mathbf{p}} \varsigma_{w, \mathbf{p}}(t, \mathbf{x})$.

Пусть $\langle t, \mathbf{x} \rangle$ - какая нибудь пространственно-временная точка.

Обозначим

$$A_k \stackrel{def}{=} \varphi_{k, w, \mathbf{p}}|_{\langle t, \mathbf{x} \rangle}$$

- значение функции $\varphi_{k, w, \mathbf{p}}$ в этой точке,

а

$$C_j \stackrel{def}{=} \left(\partial_t \varphi_{j,w,\mathbf{p}} - \sum_{s=1}^4 \sum_{\alpha=1}^3 \beta_{j,s}^{[\alpha]} \partial_\alpha \varphi_{s,w,\mathbf{p}} \right) |_{\langle t, \mathbf{x} \rangle}$$

- значение Функции $\left(\partial_t \varphi_{j,w,\mathbf{p}} - \sum_{s=1}^4 \sum_{\alpha=1}^3 \beta_{j,s}^{[\alpha]} \partial_\alpha \varphi_{s,w,\mathbf{p}} \right)$.

Здесь A_k и C_j - комплексные числа. Поэтому следующая система уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{k=1}^4 z_{j,k,w,\mathbf{p}} A_k = C_j, \\ z_{j,k,w,\mathbf{p}}^* = -z_{k,j,w,\mathbf{p}} \end{array} \right. \quad (8)$$

представляет систему из 20 алгебраических комплексных уравнений с 16 комплексными неизвестными $z_{k,j,w,\mathbf{p}}$. Эта система может быть преобразована в систему из 8 линейных вещественных уравнений с 16 вещественными неизвестными $x_{s,k} \stackrel{def}{=} \text{Re}(z_{s,k,w,\mathbf{p}})$ для $s < k$ и $y_{s,k} \stackrel{def}{=} \text{Im}(z_{s,k,w,\mathbf{p}})$ для $s \leq k$:

$$\left\{ \begin{array}{l} -y_{1,1}b_1 + x_{1,2}a_2 - y_{1,2}b_2 + x_{1,3}a_3 - y_{1,3}b_3 + x_{1,4}a_4 - y_{1,4}b_4 \\ \quad = -hwb_1 - hp_3b_1 - hp_1b_2 + hp_2a_2, \\ y_{1,1}a_1 + x_{1,2}b_2 + y_{1,2}a_2 + x_{1,3}b_3 + y_{1,3}a_3 + x_{1,4}b_4 + y_{1,4}a_4 \\ \quad = hwa_1 + hp_3a_1 + hp_1a_2 + hp_2b_2, \\ -x_{1,2}a_1 - y_{1,2}b_1 - y_{2,2}b_2 + x_{2,3}a_3 - y_{2,3}b_3 + x_{2,4}a_4 - y_{2,4}b_4 \\ \quad = -hwb_2 - hp_1b_1 - hp_2a_1 + hp_3b_2, \\ -x_{1,2}b_1 + y_{1,2}a_1 + y_{2,2}a_2 + x_{2,3}b_3 + y_{2,3}a_3 + x_{2,4}b_4 + y_{2,4}a_4 \\ \quad = hwa_2 + hp_1a_1 - hp_2b_1 - hp_3a_2, \\ -x_{1,3}a_1 - y_{1,3}b_1 - x_{2,3}a_2 - y_{2,3}b_2 - y_{3,3}b_3 + x_{3,4}a_4 - y_{3,4}b_4 \\ \quad = -hwb_3 + hp_3b_3 + hp_1b_4 - hp_2a_4, \\ -x_{1,3}b_1 + y_{1,3}a_1 - x_{2,3}b_2 + y_{2,3}a_2 + y_{3,3}a_3 + x_{3,4}b_4 + y_{3,4}a_4 \\ \quad = hwa_3 - hp_3a_3 - hp_1a_4 - hp_2b_4, \\ -x_{1,4}a_1 - y_{1,4}b_1 - x_{2,4}a_2 - y_{2,4}b_2 - x_{3,4}a_3 - y_{3,4}b_3 - y_{4,4}b_4 \\ \quad = -hwb_4 + hp_1b_3 + hp_2a_3 - hp_3b_4, \\ -x_{1,4}b_1 + y_{1,4}a_1 - x_{2,4}b_2 + y_{2,4}a_2 - x_{3,4}b_3 + y_{3,4}a_3 + y_{4,4}a_4 \\ \quad = hwa_4 - hp_1a_3 + hp_2b_3 + hp_3a_4; \end{array} \right.$$

(здесь $a_k = \text{Re}A_k$ и $b_k = \text{Im}A_k$.)

Эта система имеет решения по теореме Кронекера-Капелли. Поэтому в каждой точке $\langle t, \mathbf{x} \rangle$ существует такое комплексное число $z_{j,k,w,\mathbf{p}}|_{\langle t, \mathbf{x} \rangle}$.

Пусть $\kappa_{w,\mathbf{p}}$ - линейные операторы на линейном пространстве, натянутом на базис из функций $\varsigma_{w,\mathbf{p}}(t, \mathbf{x})$, такие, что

$$\kappa_{w,\mathbf{p}} \varsigma_{w',\mathbf{p}'} \stackrel{def}{=} \left\{ \begin{array}{l} \varsigma_{w',\mathbf{p}'}, \text{ if } w = w', \mathbf{p} = \mathbf{p}'; \\ 0, \text{ if } w \neq w' \text{ или/и } \mathbf{p} \neq \mathbf{p}' \end{array} \right.$$

Пусть $Q_{j,k}$ - оператор такой, что в каждой точке $\langle t, \mathbf{x} \rangle$:

$$Q_{j,k}|_{\langle t, \mathbf{x} \rangle} \stackrel{def}{=} \sum_{w, \mathbf{p}} (z_{j,k,w, \mathbf{p}}|_{\langle t, \mathbf{x} \rangle}) \kappa_{w, \mathbf{p}}$$

Следовательно, для каждой функции φ_j существует оператор $Q_{j,k}$ такой, что зависимость φ_j от t описывается следующим дифференциальным уравнением²:

$$\partial_t \varphi_j = \sum_{k=1}^4 \left(\beta_{j,k}^{[1]} \partial_1 + \beta_{j,k}^{[2]} \partial_2 + \beta_{j,k}^{[3]} \partial_3 + Q_{j,k} \right) \varphi_k. \quad (9)$$

$$\text{и } Q_{j,k}^* = \sum_{w, \mathbf{p}} \left(z_{j,k,w, \mathbf{p}}^*|_{\langle t, \mathbf{x} \rangle} \right) \kappa_{w, \mathbf{p}} = -Q_{k,j}.$$

В этом случае, если

$$\hat{H}_{j,k} \stackrel{def}{=} i \left(\beta_{j,k}^{[1]} \partial_1 + \beta_{j,k}^{[2]} \partial_2 + \beta_{j,k}^{[3]} \partial_3 + Q_{j,k} \right),$$

то $\hat{H}$ называется *гамильтонианом* движения с уравнением (9).

Пусть $\mathbf{H}$ - некоторое гильбертово пространство, на элементах которого определены линейные операторы $\psi_s(\mathbf{x})$ со следующими свойствами:

1. $\mathbf{H}$ содержит элемент Φ_0 такой, что:

$$\Phi_0^\dagger \Phi_0 = 1,$$

и

$$\psi_s \Phi_0 = 0, \Phi_0^\dagger \psi_s^\dagger = 0;$$

2.7.1.

$$\psi_s(\mathbf{x}) \psi_s(\mathbf{x}) = 0,$$

и

$$\psi_s^\dagger(\mathbf{x}) \psi_s^\dagger(\mathbf{x}) = 0;$$

3.

²Эта система уравнений похожа на уравнение Дирака с массовой матрицей [12], [13], [14]. Я выбрал такую форму этой системы для того, чтобы выразить поведение $\rho_A(t, \mathbf{x})$ спинорами и элементами Клиффордова множества.

$$\left\{ \psi_{s'}^\dagger(\mathbf{y}), \psi_s(\mathbf{x}) \right\} \stackrel{Def}{=} \psi_{s'}^\dagger(\mathbf{y}) \psi_s(\mathbf{x}) + \psi_s(\mathbf{x}) \psi_{s'}^\dagger(\mathbf{y}) = \delta(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \delta_{s',s} \quad (10)$$

Пусть:

$$\Psi(t, \mathbf{x}) \stackrel{def}{=} \sum_{s=1}^4 \varphi_s(t, \mathbf{x}) \psi_s^\dagger(\mathbf{x}) \Phi_0 \quad (11)$$

Из (10):

$$\Psi^\dagger(t, \mathbf{x}') \Psi(t, \mathbf{x}) = \sum_{s=1}^4 \varphi_s^*(t, \mathbf{x}') \varphi_s(t, \mathbf{x}) \delta(\mathbf{x}' - \mathbf{x}).$$

То есть из (6):

$$\int dx' \cdot \Psi^\dagger(t, \mathbf{x}') \Psi(t, \mathbf{x}) = \rho_A(t, \mathbf{x}).$$

Оператор $\mathcal{H}$, определенный как:

$$\mathcal{H}(t, \mathbf{x}) \stackrel{def}{=} \sum_{s=1}^4 \psi_s^\dagger(\mathbf{x}) \sum_{k=1}^4 \hat{H}_{s,k}(t, \mathbf{x}) \psi_k(\mathbf{x}) \quad (12)$$

называется *плотностью гамильтониана* $\hat{H}$.

Из (11):

$$-i \int d^3\mathbf{x} \cdot \mathcal{H}(t, \mathbf{x}) \Psi(t, \mathbf{x}_0) = \partial_t \Psi(t, \mathbf{x}_0).$$

Следовательно, плотность гамильтониана определяет изменение по времени вероятности события A в пространственной точке $\mathbf{x}_0$.

Я называю оператор $\psi^\dagger(\mathbf{x})$ *оператором рождения*, а $\psi(\mathbf{x})$ - *оператором уничтожения вероятности* события A в точке $\mathbf{x}$. Оператор $\psi^\dagger(\mathbf{x})$ не является оператором рождения частицы в точке $\mathbf{x}$, но этот оператор изменяет вероятность события A в этой точке. Аналогично - для $\psi(\mathbf{x})$.

Матричная форма формулы (9) имеет следующий вид:

$$\partial_t \varphi = \left(\beta^{[1]} \partial_1 + \beta^{[2]} \partial_2 + \beta^{[3]} \partial_3 + \hat{Q} \right) \varphi, \quad (13)$$

с

$$\varphi = \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \\ \varphi_4 \end{bmatrix}$$

и

$$\hat{Q} = \begin{bmatrix} i\vartheta_{1,1} & i\vartheta_{1,2} - \varpi_{1,2} & i\vartheta_{1,3} - \varpi_{1,3} & i\vartheta_{1,4} - \varpi_{1,4} \\ i\vartheta_{1,2} + \varpi_{1,2} & i\vartheta_{2,2} & i\vartheta_{2,3} - \varpi_{2,3} & i\vartheta_{2,4} - \varpi_{2,4} \\ i\vartheta_{1,3} + \varpi_{1,3} & i\vartheta_{2,3} + \varpi_{2,3} & i\vartheta_{3,3} & i\vartheta_{3,4} - \varpi_{3,4} \\ i\vartheta_{1,4} + \varpi_{1,4} & i\vartheta_{2,4} + \varpi_{2,4} & i\vartheta_{3,4} + \varpi_{3,4} & i\vartheta_{4,4} \end{bmatrix}$$

с $\varpi_{s,k} = \text{Re}(Q_{s,k})$ и $\vartheta_{s,k} = \text{Im}(Q_{s,k})$.

Пусть $\Theta_0, \Theta_3, \Upsilon_0$ и Υ_3 - решение следующей системы уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{l} -\Theta_0 + \Theta_3 - \Upsilon_0 + \Upsilon_3 = \vartheta_{1,1}; \\ -\Theta_0 - \Theta_3 - \Upsilon_0 - \Upsilon_3 = \vartheta_{2,2}; \\ -\Theta_0 - \Theta_3 + \Upsilon_0 + \Upsilon_3 = \vartheta_{3,3}; \\ -\Theta_0 + \Theta_3 + \Upsilon_0 - \Upsilon_3 = \vartheta_{4,4} \end{array} \right\},$$

ф $\Theta_1, \Upsilon_1, \Theta_2, \Upsilon_2, M_0, M_4, M_{1,0}, M_{1,4}, M_{2,0}, M_{2,4}, M_{3,0}, M_{3,4}$ - решения следующих систем:

$$\left\{ \begin{array}{l} \Theta_1 + \Upsilon_1 = \vartheta_{1,2}; \\ -\Theta_1 + \Upsilon_1 = \vartheta_{3,4}; \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -\Theta_2 - \Upsilon_2 = \varpi_{1,2}; \\ \Theta_2 - \Upsilon_2 = \varpi_{3,4}; \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} M_0 + M_{3,0} = \vartheta_{1,3}; \\ M_0 - M_{3,0} = \vartheta_{2,4}; \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} M_4 + M_{3,4} = \varpi_{1,3}; \\ M_4 - M_{3,4} = \varpi_{2,4}; \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} M_{1,0} - M_{2,4} = \vartheta_{1,4}; \\ M_{1,0} + M_{2,4} = \vartheta_{2,3}; \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} M_{1,4} - M_{2,0} = \varpi_{1,4}; \\ M_{1,4} + M_{2,0} = \varpi_{2,3} \end{array} \right\}.$$

Из (13):

$$\begin{aligned} & \left(\partial_t + i\Theta_0 + i\Upsilon_0\gamma^{[5]} \right) \varphi = \\ & = \left(\sum_{k=1}^3 \beta^{[k]} \left(\partial_k + i\Theta_k + i\Upsilon_k\gamma^{[5]} \right) + iM_0\gamma^{[0]} + iM_4\beta^{[4]} \right. \\ & \quad \left. \begin{array}{l} -iM_{1,0}\gamma_{\zeta}^{[0]} - iM_{1,4}\zeta^{[4]} - \\ -iM_{2,0}\gamma_{\eta}^{[0]} - iM_{2,4}\eta^{[4]} - \\ -iM_{3,0}\gamma_{\theta}^{[0]} - iM_{3,4}\theta^{[4]} \end{array} \right) \varphi \end{aligned} \quad (14)$$

с

$$\gamma^{[5]} \stackrel{def}{=} \begin{bmatrix} 1_2 & 0_2 \\ 0_2 & -1_2 \end{bmatrix}.$$

Здесь слагаемые

$$\begin{aligned} & -iM_{1,0}\gamma_{\zeta}^{[0]} - iM_{1,4}\zeta^{[4]} - \\ & -iM_{2,0}\gamma_{\eta}^{[0]} - iM_{2,4}\eta^{[4]} - \\ & -iM_{3,0}\gamma_{\theta}^{[0]} - iM_{3,4}\theta^{[4]} \end{aligned}$$

содержат элементы цветных пентад, а

$$\sum_{k=1}^3 \beta^{[k]} \left(\partial_k + i\Theta_k + i\Upsilon_k\gamma^{[5]} \right) + iM_0\gamma^{[0]} + iM_4\beta^{[4]}$$

содержит только элементы легкой пентады. Я называю сумму

$$\hat{H}_l \stackrel{def}{=} \sum_{k=1}^3 \beta^{[k]} \left(i\partial_k - \Theta_k - \Upsilon_k\gamma^{[5]} \right) - M_0\gamma^{[0]} - M_4\beta^{[4]} \quad (15)$$

лептонным (3 н) гамильтонианом.

3 Вращения системы $x_5 O x_4$ и B -бозонн

Если определить (6):

$$\varphi^\dagger \gamma^{[0]} \varphi \stackrel{def}{=} -j_{A,0} \text{ и } \varphi^\dagger \beta^{[4]} \varphi \stackrel{def}{=} -j_{A,4},$$

и (7):

$$\rho_A u_{A,4} \stackrel{def}{=} j_{A,4} \text{ и } \rho_A u_{A,5} \stackrel{def}{=} j_{A,5}, \quad (16)$$

то

$$\begin{aligned} -u_{A,5} &= \sin 2 \overset{*}{\alpha} \left(\sin \overset{*}{\beta} \sin \overset{*}{\chi} \cos \left(-\overset{*}{\theta} + \overset{*}{\psi} \right) + \cos \overset{*}{\beta} \cos \overset{*}{\chi} \cos \left(\overset{*}{\gamma} - \overset{*}{\lambda} \right) \right), \\ -u_{A,4} &= \sin 2 \overset{*}{\alpha} \left(-\sin \overset{*}{\beta} \sin \overset{*}{\chi} \sin \left(-\overset{*}{\theta} + \overset{*}{\psi} \right) + \cos \overset{*}{\beta} \cos \overset{*}{\chi} \sin \left(\overset{*}{\gamma} - \overset{*}{\lambda} \right) \right). \end{aligned}$$

Поэтому из (5):

$$u_{A,1}^2 + u_{A,2}^2 + u_{A,3}^2 + u_{A,4}^2 + u_{A,5}^2 = 1.$$

Следовательно, только все пять элементов клиффордовой пентады дают полный набор компонент скорости. Повидимому стоит к нашим трем пространственным координатам x_1, x_2, x_3 добавить еще две квазипространственные координаты x_5 и x_4 . Эти дополнительные координаты могут быть выбраны такими, чтобы

$$-\frac{\pi}{h} \leq x_5 \leq \frac{\pi}{h}, -\frac{\pi}{h} \leq x_4 \leq \frac{\pi}{h}.$$

x_4 и x_5 не являются координатами каких-нибудь событий. Поэтому наши приборы не обнаруживают их как пространственные координаты.

Пусть:

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}(t, x_1, x_2, x_3, x_5, x_4) &\stackrel{def}{=} \varphi(t, x_1, x_2, x_3) \cdot \\ &\cdot (\exp(-i(x_5 M_0(t, x_1, x_2, x_3) + x_4 M_4(t, x_1, x_2, x_3))))). \end{aligned}$$

В этом случае уравнение движения с лептонным гамильтонианом (15) имеет следующий вид:

$$\left(\sum_{\mu=0}^3 \beta^{[\mu]} \left(i\partial_\mu - \Theta_\mu - \Upsilon_\mu \gamma^{[5]} \right) + \gamma^{[0]} i\partial_5 + \beta^{[4]} i\partial_4 \right) \tilde{\varphi} = 0. \quad (17)$$

Пусть g_1 - некоторое положительное вещественное число, и для $\mu \in \{0, 1, 2, 3\}$: F_μ и B_μ представляет решение следующей системы уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{l} -0.5g_1 B_\mu + F_\mu = -\Theta_\mu - \Upsilon_\mu, \\ -g_1 B_\mu + F_\mu = -\Theta_\mu + \Upsilon_\mu. \end{array} \right. \quad \left| \right.$$

Матрицу заряда определяем следующим образом:

$$Y \stackrel{Def}{=} - \left[\begin{array}{cc} 1_2 & 0_2 \\ 0_2 & 2 \cdot 1_2 \end{array} \right].$$

Следовательно, из (17):

$$\left(\sum_{\mu=0}^3 \beta^{[\mu]} (i\partial_\mu + F_\mu + 0.5g_1 Y B_\mu) + \gamma^{[0]} i\partial_5 + \beta^{[4]} i\partial_4 \right) \tilde{\varphi} = 0. \quad (18)$$

Пусть $\chi(t, x_1, x_2, x_3)$ - вещественная функция, и:

$$\tilde{U}(\chi) \stackrel{def}{=} \left[\begin{array}{cc} \exp(i\frac{\chi}{2}) 1_2 & 0_2 \\ 0_2 & \exp(i\chi) 1_2 \end{array} \right]. \quad (19)$$

Так как

$$\partial_\mu \tilde{U} = -i \frac{\partial_\mu \chi}{2} Y \tilde{U}$$

и

$$\begin{aligned} \tilde{U}^\dagger \gamma^{[0]} \tilde{U} &= \gamma^{[0]} \cos \frac{\chi}{2} + \beta^{[4]} \sin \frac{\chi}{2}, \\ \tilde{U}^\dagger \beta^{[4]} \tilde{U} &= \beta^{[4]} \cos \frac{\chi}{2} - \gamma^{[0]} \sin \frac{\chi}{2}, \\ \tilde{U}^\dagger \tilde{U} &= 1_4, \\ \tilde{U}^\dagger Y \tilde{U} &= Y, \\ \beta^{[k]} \tilde{U} &= \tilde{U} \beta^{[k]} \end{aligned}$$

для $k \in \{1, 2, 3\}$,

то уравнение движения (18) инвариантно относительно следующего преобразования (повороты $x_4 O x_5$):

$$\begin{aligned}
x_4 &\rightarrow x'_4 = x_4 \cos \frac{\chi}{2} - x_5 \sin \frac{\chi}{2}; \\
x_5 &\rightarrow x'_5 = x_5 \cos \frac{\chi}{2} + x_4 \sin \frac{\chi}{2}; \\
x_\mu &\rightarrow x'_\mu = x_\mu \text{ для } \mu \in \{0, 1, 2, 3\}; \\
Y &\rightarrow Y' = \tilde{U}^\dagger Y \tilde{U} = Y; \\
\tilde{\varphi} &\rightarrow \tilde{\varphi}' = \tilde{U} \tilde{\varphi}, \\
B_\mu &\rightarrow B'_\mu = B_\mu - \frac{1}{g_1} \partial_\mu \chi, \\
F_\mu &\rightarrow F'_\mu = F_\mu.
\end{aligned} \tag{20}$$

Следовательно, B_μ подобно B -бозонному полю Стандартной Модели. Я называю это поле *B-бозонным*.

4 Массы

Пусть ϵ_μ ($\mu \in \{1, 2, 3, 4\}$) - базис, в котором легкая пентада имеет форму (2).

Спинорные функции типа

$$\frac{h}{2\pi} \exp(-ih(sx_4 + nx_5)) \epsilon_k$$

с целыми n и s образуют ортонормированный базис некоторого линейного пространства $\mathfrak{Z}$ со следующим скалярным произведением:

$$\tilde{\varphi} * \tilde{\chi} \stackrel{def}{=} \int_{-\frac{\pi}{h}}^{\frac{\pi}{h}} dx_5 \int_{-\frac{\pi}{h}}^{\frac{\pi}{h}} dx_4 \cdot (\tilde{\varphi}^\dagger \cdot \tilde{\chi}). \tag{21}$$

В этом случае из (6):

$$\tilde{\varphi} * \beta^{[\mu]} \tilde{\varphi} = -j_{A,\mu} \tag{22}$$

для $\mu \in \{0, 1, 2, 3\}$.

Гамильтониан называем *планковым гамильтонианом*, если существуют функции $N_\vartheta(t, x_1, x_2, x_3)$ и $N_\varpi(t, x_1, x_2, x_3)$, имеющие область значений в множестве целых чисел, для которых:

$$M_0 = N_\vartheta h \text{ и } M_4 = N_\varpi h.$$

В этом случае ряд Фурье для $\tilde{\varphi}$ имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}(t, x_1, x_2, x_3, x_5, x_4) &= \\ &= \varphi(t, x_1, x_2, x_3) \cdot \\ &\cdot \sum_{n,s} \delta_{-n, N_\vartheta(t, \mathbf{x})} \delta_{-s, N_\varpi(t, \mathbf{x})} \exp(-ih(nx_5 + sx_4)), \end{aligned}$$

где:

$$\begin{aligned} \delta_{-n, N_\vartheta} &= \frac{h}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{h}}^{\frac{\pi}{h}} \exp(ih(nx_5)) \exp(iN_\vartheta hx_5) dx_5 = \frac{\sin(\pi(n + N_\vartheta))}{\pi(n + N_\vartheta)}, \\ \delta_{-s, N_\varpi} &= \frac{h}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{h}}^{\frac{\pi}{h}} \exp(ih(sx_4)) \exp(iN_\varpi hx_4) dx_4 = \frac{\sin(\pi(s + N_\varpi))}{\pi(s + N_\varpi)} \end{aligned}$$

с целыми n и s .

Если обозначить:

$$\phi(t, \mathbf{x}, -n, -s) \stackrel{Def}{=} \varphi(t, \mathbf{x}) \delta_{n, N_\vartheta(t, \mathbf{x})} \delta_{s, N_\varpi(t, \mathbf{x})},$$

то

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}(t, \mathbf{x}, x_5, x_4) &= \\ &= \sum_{n,s} \phi(t, \mathbf{x}, n, s) \exp(-ih(nx_5 + sx_4)). \end{aligned} \tag{23}$$

Целые числа n и s называются *массовыми числами*.

Из свойств функции δ : в каждой точке $\langle t, \mathbf{x} \rangle$: либо

$$\tilde{\varphi}(t, \mathbf{x}, x_5, x_4) = 0,$$

либо целые числа n_0 и s_0 существуют, для которых:

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}(t, \mathbf{x}, x_5, x_4) &= \\ &= \phi(t, \mathbf{x}, n_0, s_0) \exp(-ih(n_0x_5 + s_0x_4)). \end{aligned} \tag{24}$$

Здесь если

$$m_0 \stackrel{Def}{=} \sqrt{n_0^2 + s_0^2}$$

то

$$m \stackrel{Def}{=} \hbar m_0$$

называется *массой* функции $\tilde{\varphi}$.

То есть для каждой точки пространства-времени: либо эта точка пустая, либо в этой точке помещается единственная масса.

Уравнение движения (18) при преобразовании (20) принимает следующую форму:

$$\sum_{n',s'} \left(\sum_{\mu=0}^3 \beta^{[\mu]} (i\partial_\mu + F_\mu + 0.5g_1 Y B_\mu \gamma^{[5]}) + \gamma^{[0]} i\partial'_5 + \beta^{[4]} i\partial'_4 \right) \cdot \exp(-i\hbar(n'x_5 + s'x_4)) \tilde{U}\phi = 0$$

с:

$$\begin{aligned} n' &= n \cos \frac{\chi}{2} - s \sin \frac{\chi}{2}, \\ s' &= n \sin \frac{\chi}{2} + s \cos \frac{\chi}{2}. \end{aligned}$$

Но s и n являются целыми числами, и s' и n' должны оставаться тоже целыми.

Тройка $\langle \lambda; n, s \rangle$ целых чисел называется *пифагоровой тройкой* [2], если

$$\lambda^2 = n^2 + s^2.$$

Пусть ε - маленькое положительное вещественное число. Целое число λ называется *число-отец с точностью ε* если для каждого вещественного числа χ и для каждой пифагоровой тройки $\langle \lambda; n, s \rangle$: существует пифагорова тройка $\langle \lambda; n', s' \rangle$, для которой:

$$\begin{aligned} \left| -s \sin \frac{\chi}{2} + n \cos \frac{\chi}{2} - n' \right| &< \varepsilon, \\ \left| s \cos \frac{\chi}{2} + n \sin \frac{\chi}{2} - s' \right| &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Для любого ε : существует бесконечно много чисел-отцов с точностью ε .

5 Одномассовые состояния, частицы и античастицы

Пусть (23):

$$\tilde{\varphi}(t, \mathbf{x}, x_5, x_4) = \exp(-i\hbar n x_5) \sum_{k=1}^4 \phi_k(t, \mathbf{x}, n, 0) \epsilon_k.$$

В этом случае гамильтониан имеет следующий вид (из 18):

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^3 \beta^{[k]} \mathbf{i} \partial_k + \hbar n \gamma^{[0]} + \hat{G}$$

с

$$\hat{G} \stackrel{Def}{=} \sum_{\mu=0}^3 \beta^{[\mu]} (F_{\mu} + 0.5 g_1 Y B_{\mu}).$$

Если

$$\hat{H}_0 \stackrel{Def}{=} \sum_{k=1}^3 \beta^{[k]} \mathbf{i} \partial_k + \hbar n \gamma^{[0]}, \quad (25)$$

то функции

$$u_1(\mathbf{k}) \exp(-\mathbf{i} \hbar \mathbf{k} \mathbf{x}) \text{ и } u_2(\mathbf{k}) \exp(-\mathbf{i} \hbar \mathbf{k} \mathbf{x})$$

с

$$u_1(\mathbf{k}) \stackrel{Def}{=} \frac{1}{2\sqrt{\omega(\mathbf{k})(\omega(\mathbf{k})+n)}} \begin{bmatrix} \omega(\mathbf{k}) + n + k_3 \\ k_1 + \mathbf{i} k_2 \\ \omega(\mathbf{k}) + n - k_3 \\ -k_1 - \mathbf{i} k_2 \end{bmatrix}$$

и

$$u_2(\mathbf{k}) \stackrel{Def}{=} \frac{1}{2\sqrt{\omega(\mathbf{k})(\omega(\mathbf{k})+n)}} \begin{bmatrix} k_1 - \mathbf{i} k_2 \\ \omega(\mathbf{k}) + n - k_3 \\ -k_1 + \mathbf{i} k_2 \\ \omega(\mathbf{k}) + n + k_3 \end{bmatrix}$$

являются собственными векторами для $\hat{H}_0$ с собственным значением $\omega(\mathbf{k}) \stackrel{Def}{=} \sqrt{\mathbf{k}^2 + n^2}$, а функции

$$u_3(\mathbf{k}) \exp(-\mathbf{i} \hbar \mathbf{k} \mathbf{x}) \text{ и } u_4(\mathbf{k}) \exp(-\mathbf{i} \hbar \mathbf{k} \mathbf{x})$$

с

$$u_3(\mathbf{k}) \stackrel{Def}{=} \frac{1}{2\sqrt{\omega(\mathbf{k})(\omega(\mathbf{k})+n)}} \begin{bmatrix} -\omega(\mathbf{k}) - n + k_3 \\ k_1 + ik_2 \\ \omega(\mathbf{k}) + n + k_3 \\ k_1 + ik_2 \end{bmatrix}$$

и

$$u_4(\mathbf{k}) \stackrel{Def}{=} \frac{1}{2\sqrt{\omega(\mathbf{k})(\omega(\mathbf{k})+n)}} \begin{bmatrix} k_1 - ik_2 \\ -\omega(\mathbf{k}) - n - k_3 \\ k_1 - ik_2 \\ \omega(\mathbf{k}) + n - k_3 \end{bmatrix}$$

- собственными векторами для $\hat{H}_0$ с собственными значениями $-\omega(\mathbf{k})$.

Здесь $u_\mu(\mathbf{k})$ формируют ортонормированный базис в пространстве, натянутом на векторы ϵ_μ .

Пусть:

$$b_{r,\mathbf{k}} \stackrel{Def}{=} \left(\frac{h}{2\pi}\right)^3 \sum_{j'=1}^4 \int_{(V)} d^3\mathbf{x}' \cdot e^{i\hbar\mathbf{k}\mathbf{x}'} u_{r,j'}^*(\mathbf{k}) \psi_{j'}(\mathbf{x}').$$

В этом случае так как

$$\sum_{r=1}^4 u_{r,j}^*(\mathbf{k}) u_{r,j'}(\mathbf{k}) = \delta_{j,j'},$$

то

$$\psi_j(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{k}} e^{-i\hbar\mathbf{k}\mathbf{x}} \sum_{r=1}^4 b_{r,\mathbf{k}} u_{r,j}(\mathbf{k}) \quad (26)$$

и

$$\begin{aligned} \left\{ b_{s,\mathbf{k}'}^\dagger, b_{r,\mathbf{k}} \right\} &= \left(\frac{h}{2\pi}\right)^3 \delta_{s,r} \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}, \\ \left\{ b_{s,\mathbf{k}'}^\dagger, b_{r,\mathbf{k}}^\dagger \right\} &= 0 = \left\{ b_{s,\mathbf{k}'}, b_{r,\mathbf{k}} \right\}, \\ b_{r,\mathbf{k}} \Phi_0 &= 0. \end{aligned} \quad (27)$$

Плотность гамильтониана (12) для $\hat{H}_0$ имеет вид:

$$\mathcal{H}_0(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^4 \psi_j^\dagger(\mathbf{x}) \sum_{k=1}^4 \widehat{H}_{0,j,k} \psi_k(\mathbf{x}).$$

Следовательно, из (26):

$$\int_{(V)} d^3\mathbf{x} \cdot \mathcal{H}_0(\mathbf{x}) = \left(\frac{2\pi}{h}\right)^3 \sum_{\mathbf{k}} h\omega(\mathbf{k}) \cdot \left(\sum_{r=1}^2 b_{r,\mathbf{k}}^\dagger b_{r,\mathbf{k}} - \sum_{r=3}^4 b_{r,\mathbf{k}}^\dagger b_{r,\mathbf{k}}\right).$$

Пусть преобразование Фурье для φ имеет вид:

$$\varphi_j(t, \mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{p}} \sum_{r=1}^4 c_r(t, \mathbf{p}) u_{r,j}(\mathbf{p}) e^{-i\mathbf{h}\mathbf{p}\mathbf{x}}$$

с

$$c_r(t, \mathbf{p}) \stackrel{Def}{=} \left(\frac{h}{2\pi}\right)^3 \sum_{j'=1}^4 \int_{(V)} d^3\mathbf{x}' \cdot u_{r,j'}^*(\mathbf{p}) \varphi_{j'}(t, \mathbf{x}') e^{i\mathbf{h}\mathbf{p}\mathbf{x}'}$$

Я называю функцию $\varphi_j(t, \mathbf{x})$ *обычной*, если существует вещественное число K , для которого:

если $|p_1| > K$ или/и $|p_2| > K$ или/и $|p_3| > K$, то $c_r(t, \mathbf{p}) = 0$.

В этом случае обозначаем:

$$\sum_{\mathbf{p} \in \Xi} \stackrel{Def}{=} \sum_{p_1=-L}^L \sum_{p_2=-L}^L \sum_{p_3=-L}^L.$$

Если $\varphi_j(t, \mathbf{x})$ - обычные функции, то

$$\varphi_j(t, \mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{p} \in \Xi} \sum_{r=1}^4 c_r(t, \mathbf{p}) u_{r,j}(\mathbf{p}) e^{-i\mathbf{h}\mathbf{p}\mathbf{x}}.$$

Следовательно, из (11):

$$\Psi(t, \mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{p}} \sum_{r=1}^4 \sum_{\mathbf{k}} \sum_{r'=1}^4 c_r(t, \mathbf{p}) e^{i\mathbf{h}(\mathbf{k}-\mathbf{p})\mathbf{x}} \sum_{j=1}^4 u_{r',j}^*(\mathbf{k}) u_{r,j}(\mathbf{p}) b_{r',\mathbf{k}}^\dagger \Phi_0$$

и

$$\int_{(V)} d^3 \mathbf{x} \cdot \Psi(t, \mathbf{x}) = \left(\frac{2\pi}{h} \right)^3 \sum_{\mathbf{p}} \sum_{r=1}^4 c_r(t, \mathbf{p}) b_{r,\mathbf{p}}^\dagger \Phi_0.$$

Если обозначить:

$$\tilde{\Psi}(t, \mathbf{p}) \stackrel{Def}{=} \left(\frac{2\pi}{h} \right)^3 \sum_{r=1}^4 c_r(t, \mathbf{p}) b_{r,\mathbf{p}}^\dagger \Phi_0,$$

то

$$\int_{(V)} d^3 \mathbf{x} \cdot \Psi(t, \mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{p}} \tilde{\Psi}(t, \mathbf{p})$$

и

$$H_0 \tilde{\Psi}(t, \mathbf{p}) = \left(\frac{2\pi}{h} \right)^3 \sum_{\mathbf{k}} h\omega(\mathbf{k}) \cdot \left(\sum_{r=1}^2 c_r(t, \mathbf{k}) b_{r,\mathbf{k}}^\dagger \Phi_0 - \sum_{r=3}^4 c_r(t, \mathbf{k}) b_{r,\mathbf{k}}^\dagger \Phi_0 \right).$$

На множестве обычных функций H_0 эквивалентен оператору:

$$\tilde{\tilde{H}}_0 \stackrel{Def}{=} \left(\frac{2\pi}{h} \right)^3 \sum_{\mathbf{k} \in \Xi} h\omega(\mathbf{k}) \cdot \left(\sum_{r=1}^2 b_{r,\mathbf{k}}^\dagger b_{r,\mathbf{k}} - \sum_{r=3}^4 b_{r,\mathbf{k}}^\dagger b_{r,\mathbf{k}} \right).$$

Так как (из (27))

$$b_{r,\mathbf{k}}^\dagger b_{r,\mathbf{k}} = \left(\frac{h}{2\pi} \right)^3 - b_{r,\mathbf{k}} b_{r,\mathbf{k}}^\dagger,$$

то

$$\tilde{\tilde{H}}_0 = \left(\frac{2\pi}{h} \right)^3 \sum_{\mathbf{k} \in \Xi} h\omega(\mathbf{k}) \left(\sum_{r=1}^2 b_{r,\mathbf{k}}^\dagger b_{r,\mathbf{k}} + \sum_{r=3}^4 b_{r,\mathbf{k}} b_{r,\mathbf{k}}^\dagger \right) - h \sum_{\mathbf{k} \in \Xi} \omega(\mathbf{k}). \quad (28)$$

Пусть:

$$\begin{aligned} v_{(1)}(\mathbf{k}) &\stackrel{Def}{=} \gamma^{[0]} u_3(\mathbf{k}), \\ v_{(2)}(\mathbf{k}) &\stackrel{Def}{=} \gamma^{[0]} u_4(\mathbf{k}), \\ u_{(1)}(\mathbf{k}) &\stackrel{Def}{=} u_1(\mathbf{k}), \\ u_{(2)}(\mathbf{k}) &\stackrel{Def}{=} u_2(\mathbf{k}). \end{aligned} \quad (29)$$

и пусть:

$$\begin{aligned} d_1(\mathbf{k}) &\stackrel{Def}{=} -b_3^\dagger(-\mathbf{k}), \\ d_2(\mathbf{k}) &\stackrel{Def}{=} -b_4^\dagger(-\mathbf{k}). \end{aligned}$$

В этом случае:

$$\psi_j(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{k}} \sum_{\alpha=1}^2 \left(e^{-i\mathbf{h}\mathbf{k}\mathbf{x}} b_{\alpha,\mathbf{k}} u_{(\alpha),j}(\mathbf{k}) + e^{i\mathbf{h}\mathbf{k}\mathbf{x}} d_{\alpha,\mathbf{k}}^\dagger v_{(\alpha),j}(\mathbf{k}) \right)$$

и из (28) Wick-упорядоченный гамильтониан имеет следующую форму:

$$:\tilde{H}_0: = \left(\frac{2\pi}{h} \right)^3 h \sum_{\mathbf{k} \in \Xi} \omega(\mathbf{k}) \sum_{\alpha=1}^2 \left(b_{\alpha,\mathbf{k}}^\dagger b_{\alpha,\mathbf{k}} + d_{\alpha,\mathbf{k}}^\dagger d_{\alpha,\mathbf{k}} \right).$$

Здесь $b_{\alpha,\mathbf{k}}^\dagger$ - оператор рождения, а $b_{\alpha,\mathbf{k}}$ - оператор уничтожения n -лептонна с импульсом $\mathbf{k}$ и спиновым индексом α ; $d_{\alpha,\mathbf{k}}^\dagger$ - оператор рождения, а $d_{\alpha,\mathbf{k}}$ - оператор уничтожения анти- n -лептонна с импульсом $\mathbf{k}$ и спиновым индексом α .

Функции:

$$u_{(1)}(\mathbf{k}) \exp(-i\mathbf{h}\mathbf{k}\mathbf{x}) \text{ и } u_{(2)}(\mathbf{k}) \exp(-i\mathbf{h}\mathbf{k}\mathbf{x})$$

называются *базисными n -лептонными функциями* с импульсом $\mathbf{k}$, и

$$v_{(1)}(\mathbf{k}) \exp(i\mathbf{h}\mathbf{k}\mathbf{x}) \text{ и } v_{(2)}(\mathbf{k}) \exp(i\mathbf{h}\mathbf{k}\mathbf{x})$$

называются *базисными анти- n -лептонными функциями* с импульсом $\mathbf{k}$.

6 Двухмассовое состояние [15], [16]

Рассматриваем подпространство $\mathfrak{Z}_j$ пространства $\mathfrak{Z}$, натянутое на следующий подбазис:

$$j = \left\langle \begin{aligned} &\frac{h}{2\pi} \exp(-i\mathbf{h}(s_0x_4)) \epsilon_1, \frac{h}{2\pi} \exp(-i\mathbf{h}(s_0x_4)) \epsilon_2, \\ &\frac{h}{2\pi} \exp(-i\mathbf{h}(s_0x_4)) \epsilon_3, \frac{h}{2\pi} \exp(-i\mathbf{h}(s_0x_4)) \epsilon_4, \\ &\frac{h}{2\pi} \exp(-i\mathbf{h}(n_0x_5)) \epsilon_1, \frac{h}{2\pi} \exp(-i\mathbf{h}(n_0x_5)) \epsilon_2, \\ &\frac{h}{2\pi} \exp(-i\mathbf{h}(n_0x_5)) \epsilon_3, \frac{h}{2\pi} \exp(-i\mathbf{h}(n_0x_5)) \epsilon_4 \end{aligned} \right\rangle$$

с некоторыми натуральными s_0 и n_0 .

Пусть U - какое-нибудь линейное преобразование в пространстве $\mathfrak{F}_j$ такое, что для любого $\tilde{\varphi} : \text{если } \tilde{\varphi} \in \mathfrak{F}_j, \text{ то}$

$$-(U\tilde{\varphi})^\dagger * \beta^{[\mu]}(U\tilde{\varphi}) = j_{A,\mu} \quad (30)$$

для $\mu \in \{0, 1, 2, 3\}$ (22).

В этом случае:

$$U^\dagger \beta^{[\mu]} U = \beta^{[\mu]}.^3$$

Для каждого такого преобразования U существуют вещественные функции $\chi(t, \mathbf{x})$, $\alpha(t, \mathbf{x})$, $a(t, \mathbf{x})$, $b(t, \mathbf{x})$, $c(t, \mathbf{x})$, $q(t, \mathbf{x})$, $u(t, \mathbf{x})$, $v(t, \mathbf{x})$, $k(t, \mathbf{x})$, $s(t, \mathbf{x})$ такие, что

$$U = \exp(i\alpha) \tilde{U}(\chi) U^{(-)} U^{(+)};$$

здесь $\tilde{U}(\chi)$ определяется формулой (19), а $U^{(-)}$ и $U^{(+)}$ имеют следующую матричную форму в базисе j :

$$U^{(-)}(t, \mathbf{x}) = S(a(t, \mathbf{x}), b(t, \mathbf{x}), c(t, \mathbf{x}), q(t, \mathbf{x}))$$

с

$$a^2(t, \mathbf{x}) + b^2(t, \mathbf{x}) + c^2(t, \mathbf{x}) + q^2(t, \mathbf{x}) = 1$$

и с

$$S(a, b, c, q) \stackrel{def}{=} \begin{bmatrix} (a + ib) 1_2 & 0_2 & (c + iq) 1_2 & 0_2 \\ 0_2 & 1_2 & 0_2 & 0_2 \\ (-c + iq) 1_2 & 0_2 & (a - ib) 1_2 & 0_2 \\ 0_2 & 0_2 & 0_2 & 1_2 \end{bmatrix},$$

³Я применяю следующее правило действий: если $V_{k,s}$ и β - 4×4 -матрицы, и

$$V \stackrel{def}{=} \begin{bmatrix} V_{1,1} & V_{1,2} \\ V_{2,1} & V_{2,2} \end{bmatrix},$$

то

$$\beta V \stackrel{def}{=} \begin{bmatrix} \beta V_{1,1} & \beta V_{1,2} \\ \beta V_{2,1} & \beta V_{2,2} \end{bmatrix}$$

и

$$V \beta \stackrel{def}{=} \begin{bmatrix} V_{1,1} \beta & V_{1,2} \beta \\ V_{2,1} \beta & V_{2,2} \beta \end{bmatrix}.$$

и

$$U^{(+)}(t, \mathbf{x}) = R(u(t, \mathbf{x}), v(t, \mathbf{x}), k(t, \mathbf{x}), s(t, \mathbf{x})) \quad (31)$$

с

$$u^2(t, \mathbf{x}) + v^2(t, \mathbf{x}) + k^2(t, \mathbf{x}) + s^2(t, \mathbf{x}) = 1$$

и с

$$R(u, v, k, s) \stackrel{def}{=} \begin{bmatrix} 1_2 & 0_2 & 0_2 & 0_2 \\ 0_2 & (u + iv) 1_2 & 0_2 & (k + is) 1_2 \\ 0_2 & 0_2 & 1_2 & 0_2 \\ 0_2 & (-k + is) 1_2 & 0_2 & (u - iv) 1_2 \end{bmatrix}. \quad (32)$$

$U^{(+)}$ соответствует антилептоннам, т.к. $R = S\gamma^{[5]}$ (29).

Рассматриваем $U^{(-)}$.

Пусть:

$$\ell_o \stackrel{def}{=} \iota_o(a, b, q, c), \ell_* \stackrel{def}{=} \iota_*(a, b, q, c)$$

с

$$\iota_o(a, b, q, c) \stackrel{def}{=} \frac{1}{2\sqrt{(1-a^2)}} \begin{bmatrix} (b + \sqrt{(1-a^2)}) 1_4 & (q - ic) 1_4 \\ (q + ic) 1_4 & (\sqrt{(1-a^2)} - b) 1_4 \end{bmatrix}$$

и

$$\iota_*(a, b, q, c) \stackrel{def}{=} \frac{1}{2\sqrt{(1-a^2)}} \begin{bmatrix} (\sqrt{(1-a^2)} - b) 1_4 & (-q + ic) 1_4 \\ (-q - ic) 1_4 & (b + \sqrt{(1-a^2)}) 1_4 \end{bmatrix}.$$

Эти операторы подчиняются следующим условиям:

$$\begin{aligned} \ell_o \ell_o &= \ell_o, \ell_* \ell_* = \ell_*; \\ \ell_o \ell_* &= 0 = \ell_* \ell_o, \\ (\ell_o - \ell_*) (\ell_o - \ell_*) &= 1_8, \\ \ell_o + \ell_* &= 1_8, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ell_o \gamma^{[0]} &= \gamma^{[0]} \ell_o, \ell_* \gamma^{[0]} = \gamma^{[0]} \ell_*, \\ \ell_o \beta^{[4]} &= \beta^{[4]} \ell_o, \ell_* \beta^{[4]} = \beta^{[4]} \ell_* \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} U^{(-)\dagger} \gamma^{[0]} U^{(-)} &= a \gamma^{[0]} - (\ell_o - \ell_*) \sqrt{1 - a^2} \beta^{[4]}, \\ U^{(-)\dagger} \beta^{[4]} U^{(-)} &= a \beta^{[4]} + (\ell_o - \ell_*) \sqrt{1 - a^2} \gamma^{[0]}. \end{aligned} \quad (33)$$

Из (18): лептонное уравнение движения имеет вид:

$$\left(\sum_{\mu=0}^3 \beta^{[\mu]} (i\partial_\mu + F_\mu + 0.5g_1 Y B_\mu) + \gamma^{[0]} i\partial_5 + \beta^{[4]} i\partial_4 \right) U^{(-)\dagger} U^{(-)} \tilde{\varphi} = 0.$$

Если

$$\partial_k U^{(-)\dagger} = U^{(-)\dagger} \partial_k \quad (34)$$

для $k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, то

$$\left(\begin{array}{c} U^{(-)\dagger} i \sum_{\mu=0}^3 \beta^{[\mu]} (i\partial_\mu + F_\mu + 0.5g_1 Y B_\mu) \\ + \gamma^{[0]} U^{(-)\dagger} i\partial_5 + \beta^{[4]} U^{(-)\dagger} i\partial_4 \end{array} \right) U^{(-)} \tilde{\varphi} = 0.$$

Следовательно, из (33):

$$U^{(-)\dagger} \left(\begin{array}{c} \sum_{\mu=0}^3 \beta^{[\mu]} (i\partial_\mu + F_\mu + 0.5g_1 Y B_\mu) \\ + \gamma^{[0]} i (a\partial_5 - (\ell_o - \ell_*) \sqrt{1 - a^2} \partial_4) \\ + \beta^{[4]} i (\sqrt{1 - a^2} (\ell_o - \ell_*) \partial_5 + a\partial_4) \end{array} \right) U^{(-)} \tilde{\varphi} = 0.$$

Таким образом, если обозначить:

$$\begin{aligned} x'_4 &= (\ell_o + \ell_*) a x_4 + (\ell_o - \ell_*) \sqrt{1 - a^2} x_5 \\ x'_5 &= (\ell_o + \ell_*) a x_5 - (\ell_o - \ell_*) \sqrt{1 - a^2} x_4, \end{aligned}$$

то

$$\left(\sum_{\mu=0}^3 \beta^{[\mu]} (i\partial_\mu + F_\mu + 0.5g_1 Y B_\mu) + \left(\gamma^{[0]} i\partial'_5 + \beta^{[4]} i\partial'_4 \right) \right) \tilde{\varphi}' = 0. \quad (35)$$

с

$$\tilde{\varphi}' = U^{(-)} \tilde{\varphi}.$$

То есть лептонный гамильтониан инвариантен относительно следующего глобального преобразования:

$$\begin{aligned}
\tilde{\varphi} &\rightarrow \tilde{\varphi}' = U^{(-)} \tilde{\varphi}, \\
x_4 &\rightarrow x'_4 = (\ell_{\circ} + \ell_*) a x_4 + (\ell_{\circ} - \ell_*) \sqrt{1 - a^2} x_5, \\
x_5 &\rightarrow x'_5 = (\ell_{\circ} + \ell_*) a x_5 - (\ell_{\circ} - \ell_*) \sqrt{1 - a^2} x_4, \\
x_{\mu} &\rightarrow x'_{\mu} = x_{\mu}.
\end{aligned} \tag{36}$$

6.1 Нейтринно

Пусть:

$$\begin{aligned}
&\tilde{\varphi}(t, \mathbf{x}, x_5, x_4) = \\
&= \exp(-i h s_0 x_4) \sum_{r=1}^4 \phi_{4,r}(t, \mathbf{x}, 0, s_0) \epsilon_r + \exp(-i h n_0 x_5) \sum_{r=1}^4 \phi_{5,r}(t, \mathbf{x}, n_0, 0) \epsilon_r
\end{aligned}$$

и

$$\hat{H}_{0,4} \stackrel{Def.}{=} \sum_{r=1}^3 \beta^{[r]} i \partial_r + h (n_0 \gamma^{[0]} \kappa_{n_0,0}^{\circ} + s_0 \beta^{[4]} \kappa_{0,s_0}^{\circ}).$$

8-векторы в базисе j :

$$\underline{u}_1(\mathbf{k}) \stackrel{Def}{=} \frac{1}{2\sqrt{\omega(\mathbf{k})(\omega(\mathbf{k}) + n_0)}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \omega(\mathbf{k}) + n_0 + k_3 \\ k_1 + i k_2 \\ \omega(\mathbf{k}) + n_0 - k_3 \\ -k_1 - i k_2 \end{bmatrix}$$

и

$$\underline{u}_2(\mathbf{k}) \stackrel{Def}{=} \frac{1}{2\sqrt{\omega(\mathbf{k})(\omega(\mathbf{k}) + n_0)}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ k_1 - i k_2 \\ \omega(\mathbf{k}) + n_0 - k_3 \\ -k_1 + i k_2 \\ \omega(\mathbf{k}) + n_0 + k_3 \end{bmatrix}$$

соответствуют собственным векторам для $\hat{H}_{0,4}$ с собственным значением $\omega(\mathbf{k}) = \sqrt{\mathbf{k}^2 + n_0^2}$, а 8-векторы

$$\underline{u}_3(\mathbf{k}) \stackrel{Def}{=} \frac{1}{2\sqrt{\omega(\mathbf{k})(\omega(\mathbf{k}) + n_0)}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\omega(\mathbf{k}) - n_0 + k_3 \\ k_1 + ik_2 \\ \omega(\mathbf{k}) + n_0 + k_3 \\ k_1 + ik_2 \end{bmatrix}$$

и

$$\underline{u}_4(\mathbf{k}) \stackrel{Def}{=} \frac{1}{2\sqrt{\omega(\mathbf{k})(\omega(\mathbf{k}) + n_0)}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ k_1 - ik_2 \\ -\omega(\mathbf{k}) - n_0 - k_3 \\ k_1 - ik_2 \\ \omega(\mathbf{k}) + n_0 - k_3 \end{bmatrix}$$

соответствуют собственным векторам для $\hat{H}_{0,4}$ с собственным значением $-\omega(\mathbf{k})$.

Пусть

$$\begin{aligned} \hat{H}'_{0,4} &\stackrel{Def}{=} U^{(-)} \hat{H}_{0,4} U^{(-)\dagger}, \\ \underline{u}'_\mu(\mathbf{k}) &\stackrel{Def}{=} U^{(-)} \underline{u}_\mu(\mathbf{k}). \end{aligned}$$

То есть

$$\underline{u}'_1(\mathbf{k}) = \frac{1}{2\sqrt{\omega(\mathbf{k})(\omega(\mathbf{k}) + n)}} \begin{bmatrix} (c + iq)(\omega(\mathbf{k}) + n_0 + k_3) \\ (c + iq)(k_1 + ik_2) \\ 0 \\ 0 \\ (a - ib)(\omega(\mathbf{k}) + n_0 + k_3) \\ (a - ib)(k_1 + ik_2) \\ \omega(\mathbf{k}) + n_0 - k_3 \\ -k_1 - ik_2 \end{bmatrix},$$

$$\underline{u}'_2(\mathbf{k}) = \frac{1}{2\sqrt{\omega(\mathbf{k})(\omega(\mathbf{k}) + n_0)}} \begin{bmatrix} (c + iq)(k_1 - ik_2) \\ (c + iq)(\omega(\mathbf{k}) + n_0 - k_3) \\ 0 \\ 0 \\ (a - ib)(k_1 - ik_2) \\ (a - ib)(\omega(\mathbf{k}) + n_0 - k_3) \\ -k_1 + ik_2 \\ \omega(\mathbf{k}) + n_0 + k_3 \end{bmatrix},$$

$$\underline{u}'_3(\mathbf{k}) = \frac{1}{2\sqrt{\omega(\mathbf{k})(\omega(\mathbf{k}) + n_0)}} \begin{bmatrix} -(c + iq)(\omega(\mathbf{k}) + n_0 - k_3) \\ (c + iq)(k_1 + ik_2) \\ 0 \\ 0 \\ -(a - ib)(\omega(\mathbf{k}) + n_0 - k_3) \\ (a - ib)(k_1 + ik_2) \\ \omega(\mathbf{k}) + n_0 + k_3 \\ k_1 + ik_2 \end{bmatrix},$$

$$\underline{u}'_4(\mathbf{k}) = \frac{1}{2\sqrt{\omega(\mathbf{k})(\omega(\mathbf{k}) + n_0)}} \begin{bmatrix} (c + iq)(k_1 - ik_2) \\ -(c + iq)(\omega(\mathbf{k}) + n_0 + k_3) \\ 0 \\ 0 \\ (a - ib)(k_1 - ik_2) \\ -(a - ib)(\omega(\mathbf{k}) + n_0 + k_3) \\ k_1 - ik_2 \\ \omega(\mathbf{k}) + n_0 - k_3 \end{bmatrix}.$$

Здесь $\underline{u}'_1(\mathbf{k})$ и $\underline{u}'_2(\mathbf{k})$ соответствуют собственным векторам для $\hat{H}'_{0,4}$ с собственным значением $\omega(\mathbf{k}) = \sqrt{\mathbf{k}^2 + n_0^2}$, и $\underline{u}'_3(\mathbf{k})$ и $\underline{u}'_4(\mathbf{k})$ соответствуют собственным векторам для $\hat{H}_{0,4}$ с собственным значением $-\omega(\mathbf{k})$.

Пусть в (29):

$$\begin{aligned} \underline{v}_{(1)}(\mathbf{k}) &\stackrel{Def}{=} \underline{\gamma^{[0]}} \underline{u}'_3(\mathbf{k}), \\ \underline{v}_{(2)}(\mathbf{k}) &\stackrel{Def}{=} \underline{\gamma^{[0]}} \underline{u}'_4(\mathbf{k}), \\ \underline{u}_{(1)}(\mathbf{k}) &\stackrel{Def}{=} \underline{u}'_1(\mathbf{k}), \\ \underline{u}_{(2)}(\mathbf{k}) &\stackrel{Def}{=} \underline{u}'_2(\mathbf{k}). \end{aligned}$$

Поэтому,

$$\underline{v}_{(1)}(\mathbf{k}) = \frac{1}{2\sqrt{\omega(\mathbf{k})(\omega(\mathbf{k}) + n_0)}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -(c + iq)(\omega(\mathbf{k}) + n_0 - k_3) \\ (c + iq)(k_1 + ik_2) \\ \omega(\mathbf{k}) + n_0 + k_3 \\ k_1 + ik_2 \\ -(a - ib)(\omega(\mathbf{k}) + n_0 - k_3) \\ (a - ib)(k_1 + ik_2) \end{bmatrix}$$

и

$$\underline{v}_{(2)}(\mathbf{k}) = \frac{1}{2\sqrt{\omega(\mathbf{k})(\omega(\mathbf{k}) + n_0)}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ (c + iq)(k_1 - ik_2) \\ -(c + iq)(\omega(\mathbf{k}) + n_0 + k_3) \\ k_1 - ik_2 \\ \omega(\mathbf{k}) + n_0 - k_3 \\ (a - ib)(k_1 - ik_2) \\ -(a - ib)(\omega(\mathbf{k}) + n_0 + k_3) \end{bmatrix}.$$

$\underline{v}'_{(\alpha)}(\mathbf{k})$ называется *би- n_0 -лептонными*, а $\underline{v}_{(\alpha)}(\mathbf{k})$ - *би-анти- n_0 -лептонными* базисными векторами с импульсом $\mathbf{k}$ и спиновым индексом α .

Следовательно, би-анти- n_0 -лептонные базисные векторы являются результатом действия оператора $U^{(+)}$ (31).

Векторы

$$l_{n_0,(1)}(\mathbf{k}) = \begin{bmatrix} (a - ib)(\omega(\mathbf{k}) + n_0 + k_3) \\ (a - ib)(k_1 + ik_2) \\ \omega(\mathbf{k}) + n_0 - k_3 \\ -k_1 - ik_2 \end{bmatrix} \text{ и } l_{n_0,(2)}(\mathbf{k}) = \begin{bmatrix} (a - ib)(k_1 - ik_2) \\ (a - ib)(\omega(\mathbf{k}) + n_0 - k_3) \\ -k_1 + ik_2 \\ \omega(\mathbf{k}) + n_0 + k_3 \end{bmatrix}$$

называются *лептонными компонентами* би- n_0 -лептонных базисных векторов, а векторы

$$\nu_{n_0,(1)}(\mathbf{k}) = \begin{bmatrix} \omega(\mathbf{k}) + n_0 + k_3 \\ k_1 + ik_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ и } \nu_{n_0,(2)}(\mathbf{k}) = \begin{bmatrix} k_1 - ik_2 \\ \omega(\mathbf{k}) + n_0 - k_3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

называются *нейтринными компонентами* би- n_0 -лептонных базисных векторов.

Векторы

$$\bar{l}_{n_0,(1)}(\mathbf{k}) = \begin{bmatrix} \omega(\mathbf{k}) + n_0 + k_3 \\ k_1 + ik_2 \\ -(a - ib)(\omega(\mathbf{k}) + n_0 - k_3) \\ (a - ib)(k_1 + ik_2) \end{bmatrix} \text{ и }$$

$$\bar{l}_{n_0,(2)}(\mathbf{k}) = \begin{bmatrix} k_1 - ik_2 \\ \omega(\mathbf{k}) + n_0 - k_3 \\ (a - ib)(k_1 - ik_2) \\ -(a - ib)(\omega(\mathbf{k}) + n_0 + k_3) \end{bmatrix}$$

называются *лептонными компонентами* анти-би- n_0 -лептонных базисных векторов, а векторы

$$\bar{\nu}_{n_0,(1)}(\mathbf{k}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -(\omega(\mathbf{k}) + n_0 - k_3) \\ k_1 + ik_2 \end{bmatrix} \text{ и } \bar{\nu}_{n_0,(2)}(\mathbf{k}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ k_1 - ik_2 \\ -(\omega(\mathbf{k}) + n_0 + k_3) \end{bmatrix}$$

называются *нейтринными компонентами* анти-би- n_0 -лептонных базисных векторов.

6.2 Электрослабые преобразования

Пусть (34) не выполняется для $k \in \{0, 1, 2, 3\}$, и:

$$K \stackrel{def}{=} \sum_{\mu=0}^3 \beta^{[\mu]} (F_\mu + 0.5g_1 Y B_\mu). \quad (37)$$

В таком случае из (18) уравнение движения получает такую форму:

$$\left(K + \sum_{\mu=0}^3 \beta^{[\mu]} i\partial_\mu + \gamma^{[0]} i\partial_5 + \beta^{[4]} i\partial_4 \right) \tilde{\varphi} = 0. \quad (38)$$

Поэтому для следующего преобразования:

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi} &\rightarrow \tilde{\varphi}' \stackrel{def}{=} U^{(-)} \tilde{\varphi}, \\ x_4 &\rightarrow x'_4 \stackrel{def}{=} (\ell_o + \ell_*) ax_4 + (\ell_o - \ell_*) \sqrt{1 - a^2} x_5, \\ x_5 &\rightarrow x'_5 \stackrel{def}{=} (\ell_o + \ell_*) ax_5 - (\ell_o - \ell_*) \sqrt{1 - a^2} x_4, \\ x_\mu &\rightarrow x'_\mu \stackrel{def}{=} x_\mu, \text{ для } \mu \in \{0, 1, 2, 3\}, \\ K &\rightarrow K' \end{aligned} \quad (39)$$

с

$$\partial_4 U^{(-)} = U^{(-)} \partial_4 \text{ и } \partial_5 U^{(-)} = U^{(-)} \partial_5$$

это уравнение имеет такую форму:

$$\left(\begin{array}{c} U^{(-)\dagger} K' U^{(-)} + \\ + \sum_{\mu=0}^3 \beta^{[\mu]} i \left(\partial_\mu + U^{(-)\dagger} (\partial_\mu U^{(-)}) \right) + \gamma^{[0]} i \partial_5 + \beta^{[4]} i \partial_4 \end{array} \right) \tilde{\varphi} = 0. \quad (40)$$

Следовательно, если

$$K' = K - i \sum_{\mu=0}^3 \beta^{[\mu]} \left(\partial_\mu U^{(-)} \right) U^{(-)\dagger}, \quad (41)$$

то уравнение (38) инвариантно для локальных преобразований (39).

Пусть g_2 - некоторое положительное число.

Если обозначить $(a, b, c, q$ из $U^{(-)}$):

$$\begin{aligned} W_\mu^0, & \stackrel{def}{=} -\frac{2}{g_2 q} \left(\begin{array}{c} q (\partial_\mu a) b - q (\partial_\mu b) a + (\partial_\mu c) q^2 + \\ + a (\partial_\mu a) c + b (\partial_\mu b) c + c^2 (\partial_\mu c) \end{array} \right) \\ W_\mu^1, & \stackrel{def}{=} -\frac{2}{g_2 q} \left(\begin{array}{c} (\partial_\mu a) a^2 - b q (\partial_\mu c) + a (\partial_\mu b) b + \\ + a (\partial_\mu c) c + q^2 (\partial_\mu a) + c (\partial_\mu b) q \end{array} \right) \\ W_\mu^2, & \stackrel{def}{=} -\frac{2}{g_2 q} \left(\begin{array}{c} q (\partial_\mu a) c - a (\partial_\mu a) b - b^2 (\partial_\mu b) - \\ - c (\partial_\mu c) b - (\partial_\mu b) q^2 - (\partial_\mu c) q a \end{array} \right) \end{aligned}$$

и

$$W_\mu \stackrel{def}{=} \begin{bmatrix} W_\mu^0, 1_2 & 0_2 & (W_\mu^1, -iW_\mu^2), 1_2 & 0_2 \\ 0_2 & 0_2 & 0_2 & 0_2 \\ (W_\mu^1, +iW_\mu^2), 1_2 & 0_2 & -W_\mu^0, 1_2 & 0_2 \\ 0_2 & 0_2 & 0_2 & 0_2 \end{bmatrix},$$

то

$$-i \left(\partial_\mu U^{(-)} \right) U^{(-)\dagger} = \frac{1}{2} g_2 W_\mu, \quad (42)$$

и из (42), (37), (41), (38):

$$\left(\begin{array}{c} \sum_{\mu=0}^3 \beta^{[\mu]} i \left(\partial_\mu - i 0.5 g_1 B_\mu Y - i \frac{1}{2} g_2 W_\mu - i F_\mu \right) \\ + \gamma^{[0]} i \partial'_5 + \beta^{[4]} i \partial'_4 \end{array} \right) \tilde{\varphi}' = 0. \quad (43)$$

Пусть

$$U' \stackrel{def}{=} S(a', b', c', q').$$

В этом случае если

$$U'' \stackrel{\text{def}}{=} U' U^{(-)},$$

то существуют вещественные функции $a''(t, \mathbf{x})$, $b''(t, \mathbf{x})$, $c''(t, \mathbf{x})$, $q''(t, \mathbf{x})$ такие, что U'' имеет подобную форму:

$$U'' \stackrel{\text{def}}{=} S(a'', b'', c'', q'').$$

Если

$$\ell''_{\circ} \stackrel{\text{def}}{=} \iota_{\circ}(a'', b'', q'', c''), \ell''_{*} \stackrel{\text{def}}{=} \iota_{*}(a'', b'', q'', c''),$$

и

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi} &\rightarrow \tilde{\varphi}'' \stackrel{\text{def}}{=} U'' \tilde{\varphi}, \\ x_4 &\rightarrow x_4'' \stackrel{\text{def}}{=} (\ell''_{\circ} + \ell''_{*}) a'' x_4 + (\ell''_{\circ} - \ell''_{*}) \sqrt{1 - a''^2} x_5, \\ x_5 &\rightarrow x_5'' \stackrel{\text{def}}{=} (\ell''_{\circ} + \ell''_{*}) a'' x_5 - (\ell''_{\circ} - \ell''_{*}) \sqrt{1 - a''^2} x_4, \\ x_{\mu} &\rightarrow x_{\mu}'' \stackrel{\text{def}}{=} x_{\mu}, \text{ для } \mu \in \{0, 1, 2, 3\}, \\ K &\rightarrow K'' \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{\mu=0}^3 \beta^{[\mu]} \left(F_{\mu} + 0.5 g_1 Y B_{\mu} + \frac{1}{2} g_2 W_{\mu}'' \right), \end{aligned} \tag{44}$$

то из (42):

$$W_{\mu}'' = -\frac{2i}{g_2} \left(\partial_{\mu} (U' U^{(-)}) \right) \left(U' U^{(-)} \right)^{\dagger}.$$

Поэтому:

$$W_{\mu}'' = -\frac{2i}{g_2} (\partial_{\mu} U') U'^{\dagger} - \frac{2i}{g_2} U' \left(\partial_{\mu} U^{(-)} \right) U^{(-)\dagger} U'^{\dagger},$$

т.е. из (42):

$$W_{\mu}'' = U' W_{\mu} U'^{\dagger} - \frac{2i}{g_2} (\partial_{\mu} U') U'^{\dagger} \tag{45}$$

как в Стандартной Модели.

Уравнение движения $SU(2)$ Янг-Миллса поля без материи (например в [17] или в [18]) имеет следующую форму:

$$\partial^\nu \mathbf{W}_{\mu\nu} = -g_2 \mathbf{W}^\nu \times \mathbf{W}_{\mu\nu}$$

с:

$$\mathbf{W}_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathbf{W}_\nu - \partial_\nu \mathbf{W}_\mu + g_2 \mathbf{W}_\mu \times \mathbf{W}_\nu$$

и

$$\mathbf{W}_\mu = \begin{bmatrix} W_\mu^0, \\ W_\mu^1, \\ W_\mu^2, \end{bmatrix}.$$

Поэтому уравнение движения для W_μ^0 , имеет такой вид:

$$\begin{aligned} \partial^\nu \partial_\nu W_\mu^0 = & g_2^2 (W^{2,\nu} W_\nu^2 + W^{1,\nu} W_\nu^1) W_\mu^0 - \\ & - g_2^2 (W^{1,\nu} W_\mu^1 + W^{2,\nu} W_\mu^2) W_\nu^0 + \\ & + g_2 \partial^\nu (W_\mu^1 W_\nu^2 - W_\mu^2 W_\nu^1) + \\ & + g_2 (W^{1,\nu} \partial_\mu W_\nu^2 - W^{1,\nu} \partial_\nu W_\mu^2 - W^{2,\nu} \partial_\mu W_\nu^1 + W^{2,\nu} \partial_\nu W_\mu^1) + \\ & + \partial^\nu \partial_\mu W_\nu^0, \end{aligned} \quad (46)$$

с $g_{0,0} = 1, g_{1,1} = g_{2,2} = g_{3,3} = -1$ (т.е.: $W^\nu W_\nu = W^0 W_0 - W^1 W_1 - W^2 W_2 - W^3 W_3$. В калибровке с $W_0 = 0$: $W^\nu W_\nu = -(W^1 W_1 + W^2 W_2 + W^3 W_3)$).

W_μ^1 , и W_μ^2 , подчиняются таким же уравнениям.

Это уравнение может быть преобразовано к следующему виду:

$$\begin{aligned} \partial^\nu \partial_\nu W_\mu^0 = & [g_2^2 (W^{2,\nu} W_\nu^2 + W^{1,\nu} W_\nu^1 + W^{0,\nu} W_\nu^0)] \cdot W_\mu^0 - \\ & - g_2^2 (W^{1,\nu} W_\mu^1 + W^{2,\nu} W_\mu^2 + W^{0,\nu} W_\mu^0) W_\nu^0 + \\ & + g_2 \partial^\nu (W_\mu^1 W_\nu^2 - W_\mu^2 W_\nu^1) + \\ & + g_2 (W^{1,\nu} \partial_\mu W_\nu^2 - W^{1,\nu} \partial_\nu W_\mu^2 - W^{2,\nu} \partial_\mu W_\nu^1 + W^{2,\nu} \partial_\nu W_\mu^1) + \\ & + \partial^\nu \partial_\mu W_\nu^0. \end{aligned}$$

Оно похоже на уравнение Клейна-Гордона поля W_μ^0 , с массой

$$g_2 [- (W^{2,\nu} W_\nu^2 + W^{1,\nu} W_\nu^1 + W^{0,\nu} W_\nu^0)]^{\frac{1}{2}}. \quad (47)$$

и с дополнительными членами взаимодействия поля W_μ^0 , с другими компонентами поля $\mathbf{W}$.

"Масса" (47) инвариантна относительно поворотов и преобразований Лоренца:

$$\left\{ \begin{array}{l} W_r^{k,'} = W_r^k \cos \lambda - W_s^k \sin \lambda, \\ W_s^{k,'} = W_r^k \sin \lambda + W_s^k \cos \lambda; \end{array} \right|$$

$$\left\{ \begin{array}{l} W_0^{k,'} = W_0^k \cosh \lambda - W_s^k \sinh \lambda, \\ W_s^{k,'} = W_s^k \cosh \lambda - W_0^k \sinh \lambda \end{array} \right|$$

с вещественным λ и с $r \in \{1, 2, 3\}$ и $s \in \{1, 2, 3\}$, и (47) инвариантно относительно глобальных изоспиновых преобразований $U^{(+)}$:

$$W'_\nu \rightarrow W''_\nu = U' W_\nu U'^\dagger,$$

но не инвариантно относительно локальных преобразований (45)

Уравнение (46) можно упростить:

$$\begin{aligned} \sum_\nu g_{\nu,\nu} \partial^\nu \partial_\nu W_\mu^0 &= \left[g_2^2 \sum_{\nu \neq \mu} g_{\nu,\nu} \left((W_\nu^{2,})^2 + (W_\nu^{1,})^2 \right) \right] \cdot W_\mu^0 - \\ &\quad - g_2^2 \sum_{\nu \neq \mu} g_{\nu,\nu} (W^{1,\nu} W_\mu^1 + W^{2,\nu} W_\mu^2) W_\nu^0 - \\ &\quad + g_2 \sum_\nu g_{\nu,\nu} \partial^\nu (W_\mu^1 W_\nu^2 - W_\mu^2 W_\nu^1) + \\ + g_2 \sum_\nu g_{\nu,\nu} (W^{1,\nu} \partial_\mu W_\nu^2 - W^{1,\nu} \partial_\nu W_\mu^2 - W^{2,\nu} \partial_\mu W_\nu^1 + W^{2,\nu} \partial_\nu W_\mu^1) + \\ &\quad + \partial_\mu \sum_\nu g_{\nu,\nu} \partial^\nu W_\nu^0. \end{aligned}$$

(здесь нет суммирования по повторяющимся индексам " ν "; суммирование выражается символом " $\sum$ ") .

В этом уравнении форма

$$g_2 \left[- \sum_{\nu \neq \mu} g_{\nu,\nu} \left((W_\nu^{2,})^2 + (W_\nu^{1,})^2 \right) \right]^{\frac{1}{2}}$$

может меняться в пространстве, но она не содержит W_μ^0 , и локально действует как масса, т.е. не позволяет частицам этого поля вести себя подобно безмассовым частицам.

Пусть

$$\begin{aligned} \alpha &\stackrel{def}{=} \arctan \frac{g_1}{g_2}, \\ Z_\mu &\stackrel{def}{=} (W_\mu^0 \cos \alpha - B_\mu \sin \alpha), \\ A_\mu &\stackrel{def}{=} (B_\mu \cos \alpha + W_\mu^0 \sin \alpha). \end{aligned}$$

В этом случае:

$$\sum_{\nu} g_{\nu,\nu} \partial_{\nu} \partial_{\nu} W_{\mu}^0 = \cos \alpha \cdot \sum_{\nu} g_{\nu,\nu} \partial_{\nu} \partial_{\nu} Z_{\mu} + \sin \alpha \cdot \sum_{\nu} g_{\nu,\nu} \partial_{\nu} \partial_{\nu} A_{\mu}.$$

Если

$$\sum_{\nu} g_{\nu,\nu} \partial_{\nu} \partial_{\nu} A_{\mu} = 0,$$

то

$$m_Z = \frac{m_W}{\cos \alpha}$$

с m_W из (47). Это почти как в Стандартной Модели.

7 Повороты декартовой системы координат и кваррки

Пусть α - вещественное число, и

$$\begin{aligned} x'_1 &\stackrel{def}{=} x_1 \cos(\alpha) - x_2 \sin(\alpha); \\ x'_2 &\stackrel{def}{=} x_1 \sin(\alpha) + x_2 \cos(\alpha); \\ x'_3 &\stackrel{def}{=} x_3. \end{aligned} \tag{48}$$

Следовательно для любой функции φ :

$$\begin{aligned} \partial'_1 \varphi &= (\partial_1 \varphi \cdot \cos \alpha - \partial_2 \varphi \cdot \sin \alpha); \\ \partial'_2 \varphi &= (\partial_2 \varphi \cdot \cos \alpha + \partial_1 \varphi \cdot \sin \alpha); \end{aligned} \tag{49}$$

$$\partial'_3 \varphi = \partial_3 \varphi. \tag{50}$$

Так как $\mathbf{j}_A$ - 3-вектор, то из (6):

$$\begin{aligned} j'_{A,1} &= -\varphi^\dagger \left(\beta^{[1]} \cos(\alpha) - \beta^{[2]} \sin(\alpha) \right) \varphi; \\ j'_{A,2} &= -\varphi^\dagger \left(\beta^{[1]} \sin(\alpha) + \beta^{[2]} \cos(\alpha) \right) \varphi; \\ j'_{A,3} &= -\varphi^\dagger \beta^{[3]} \varphi. \end{aligned}$$

Следовательно, если для φ' :

$$\begin{aligned} j'_{A,1} &= -\varphi'^{\dagger} \beta^{[1]} \varphi'; \\ j'_{A,2} &= -\varphi'^{\dagger} \beta^{[2]} \varphi'; \\ j'_{A,3} &= -\varphi'^{\dagger} \beta^{[3]} \varphi', \end{aligned}$$

и

$$\varphi' \stackrel{def}{=} U_{1,2}(\alpha) \varphi,$$

то

$$\begin{aligned} U_{1,2}^{\dagger}(\alpha) \beta^{[1]} U_{1,2}(\alpha) &= \beta^{[1]} \cos \alpha - \beta^{[2]} \sin \alpha; \\ U_{1,2}^{\dagger}(\alpha) \beta^{[2]} U_{1,2}(\alpha) &= \beta^{[2]} \cos \alpha + \beta^{[1]} \sin \alpha; \\ U_{1,2}^{\dagger}(\alpha) \beta^{[3]} U_{1,2}(\alpha) &= \beta^{[3]}; \end{aligned} \tag{51}$$

из (6): так как

$$\rho_A = \varphi^{\dagger} \varphi = \varphi'^{\dagger} \varphi',$$

то

$$U_{1,2}^{\dagger}(\alpha) U_{1,2}(\alpha) = 1_4. \tag{52}$$

Если

$$U_{1,2}(\alpha) = \cos \frac{\alpha}{2} \cdot 1_4 - \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \beta^{[1]} \beta^{[2]},$$

то $U_{1,2}(\alpha)$ подчиняется всем этим условиям ((51), (52)). Более того:

$$\begin{aligned} U_{1,2}^{\dagger}(\alpha) \beta^{[4]} U_{1,2}(\alpha) &= \beta^{[4]}; \\ U_{1,2}^{\dagger}(\alpha) \gamma^{[0]} U_{1,2}(\alpha) &= \gamma^{[0]}, \end{aligned} \tag{53}$$

$$U_{1,2}^{\dagger}(\alpha) \gamma^{[5]} U_{1,2}(\alpha) = \gamma^{[5]}.$$

Пусть $\hat{H}'_l$ - результат замены $\beta^{[k]}$ на $\beta^{[k]'} = U_{1,2}^{\dagger}(\alpha) \beta^{[k]} U_{1,2}(\alpha)$ и ∂_k - на $\partial'_k = \frac{\partial}{\partial x'_k}$ в $\hat{H}_l$.

Из (49), (51), (52) и (53):

$$\widehat{H}_l' = i \left(\begin{array}{l} \beta^{[1]} \left(\begin{array}{l} \partial_1 + i(\Theta_1' \cos(\alpha) + \Theta_2' \sin(\alpha)) + \\ + i(\Upsilon_1' \cos(\alpha) + \Upsilon_2' \sin(\alpha)) \gamma^{[5]} \end{array} \right) + \\ + \beta^{[2]} \left(\begin{array}{l} \partial_2 + i(-\Theta_1' \sin(\alpha) + \Theta_2' \cos(\alpha)) + \\ + i(-\Upsilon_1' \sin(\alpha) + \Upsilon_2' \cos(\alpha)) \gamma^{[5]} \end{array} \right) + \\ + \beta^{[3]} (\partial_3 + i\Theta_3' + i\Upsilon_3' \gamma^{[5]}) + \\ + iM_0' \gamma^{[0]} + iM_4 \beta^{[4]} \end{array} \right) +$$

Следовательно, если

$$\begin{aligned} \Theta_0' &= \Theta_0, \\ \Theta_1' &= \Theta_1 \cos(\alpha) - \Theta_2 \sin(\alpha), \\ \Theta_2' &= \Theta_1 \sin(\alpha) + \Theta_2 \cos(\alpha), \\ \Theta_3' &= \Theta_3, \end{aligned}$$

и такая же формула для $\langle \Upsilon_0, \Upsilon_1, \Upsilon_2, \Upsilon_3 \rangle$, то $\widehat{H}_l' = \widehat{H}_l$ при поворотах декартовой системы (48).

Но:

$$\begin{aligned} U_{1,2}^\dagger(\alpha) \zeta^{[1]} U_{1,2}(\alpha) &= \zeta^{[1]} \cos \alpha - \eta^{[2]} \sin \alpha; \\ U_{1,2}^\dagger(\alpha) \eta^{[2]} U_{1,2}(\alpha) &= \eta^{[2]} \cos \alpha + \zeta^{[1]} \sin \alpha; \end{aligned} \quad (54)$$

$$\begin{aligned} U_{1,2}^\dagger(\alpha) \zeta^{[2]} U_{1,2}(\alpha) &= \zeta^{[2]} \cos \alpha - \eta^{[1]} \sin \alpha; \\ U_{1,2}^\dagger(\alpha) \eta^{[1]} U_{1,2}(\alpha) &= \eta^{[1]} \cos \alpha + \zeta^{[2]} \sin \alpha; \end{aligned} \quad (55)$$

$$\begin{aligned} U_{1,2}^\dagger(\alpha) \zeta^{[3]} U_{1,2}(\alpha) &= \zeta^{[3]}; \\ U_{1,2}^\dagger(\alpha) \eta^{[3]} U_{1,2}(\alpha) &= \eta^{[3]}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_{1,2}^\dagger(\alpha) \gamma_\zeta^{[0]} U_{1,2}(\alpha) &= \gamma_\zeta^{[0]} \cos \alpha - \gamma_\eta^{[0]} \sin \alpha; \\ U_{1,2}^\dagger(\alpha) \gamma_\eta^{[0]} U_{1,2}(\alpha) &= \gamma_\eta^{[0]} \cos \alpha + \gamma_\zeta^{[0]} \sin \alpha; \\ U_{1,2}^\dagger(\alpha) \gamma_\theta^{[0]} U_{1,2}(\alpha) &= \gamma_\theta^{[0]}; \end{aligned} \quad (56)$$

$$\begin{aligned} U_{1,2}^\dagger(\alpha) \zeta^{[4]} U_{1,2}(\alpha) &= \zeta^{[4]} \cos \alpha + \eta^{[4]} \sin \alpha; \\ U_{1,2}^\dagger(\alpha) \eta^{[4]} U_{1,2}(\alpha) &= \eta^{[4]} \cos \alpha - \zeta^{[4]} \sin \alpha; \\ U_{1,2}^\dagger(\alpha) \theta^{[4]} U_{1,2}(\alpha) &= \theta^{[4]} \end{aligned} \quad (57)$$

и

$$\begin{aligned} U_{1,2}^\dagger(\alpha) \theta^{[1]} U_{1,2}(\alpha) &= \theta^{[1]} \cos \alpha + \theta^{[2]} \sin \alpha; \\ U_{1,2}^\dagger(\alpha) \theta^{[2]} U_{1,2}(\alpha) &= \theta^{[2]} \cos \alpha - \theta^{[1]} \sin \alpha; \\ U_{1,2}^\dagger(\alpha) \theta^{[3]} U_{1,2}(\alpha) &= \theta^{[3]}. \end{aligned}$$

Следовательно из (54), (55), (56), (57):

$\hat{H}(\zeta)$ перемешивается с $\hat{H}(\eta)$ при таком повороте. Для других поворотов декартовой системы: лептонные гамильтонианы преобразуются в лептонные, а цветные перемешиваются между собой.

Поэтому цветная тройка элементов не может быть разделена в пространстве. Эти частицы должны быть локализованы в одном и том же месте (конфайнмент?).

Каждая цветная пентада содержит по два массовых элемента. Следовательно, каждое семейство содержит два сорта цветных частиц трех цветов. Я называю эти частицы *кваррками*.

8 Вкусовые пентады

Я называю 4×4 матрицы типа

$$\begin{bmatrix} \vartheta & 0_2 \\ 0_2 & v \end{bmatrix}$$

2-диагональными, а

$$\begin{bmatrix} 0_2 & \vartheta \\ v & 0_2 \end{bmatrix}$$

- 2-антидиагональными.

Таким образом, в лептонном уравнении движения три 2-диагональных элемента легкой пентады определяет 3-мерное пространство событий, а два 2-антидиагональных элемента образуют 2-мерное пространство электрослабых взаимодействий. Аналогично для цветных пентад.

Для сладкой пентады вектор локальной скорости имеет следующие компоненты:

$$\rho u_0^{\underline{\Delta}} \stackrel{def}{=} \varphi^\dagger \underline{\Delta}^{[0]} \varphi = -\cos\left(2 \cdot \overset{*}{\alpha}\right),$$

$$\rho u_1^{\underline{\Delta}} \stackrel{def}{=} \varphi^\dagger \underline{\Delta}^{[1]} \varphi = -\sin\left(2 \cdot \overset{*}{\alpha}\right) \cdot \begin{bmatrix} \cos\left(\overset{*}{\beta}\right) \cdot \sin\left(\overset{*}{\chi}\right) \cos\left(\overset{*}{\gamma} - \overset{*}{v}\right) \\ + \sin\left(\overset{*}{\beta}\right) \cdot \cos\left(\overset{*}{\chi}\right) \cos\left(\overset{*}{\theta} - \overset{*}{\lambda}\right) \end{bmatrix},$$

$$\rho u_2^{\underline{\Delta}} \stackrel{def}{=} \varphi^\dagger \underline{\Delta}^{[2]} \varphi = -\sin\left(2 \cdot \overset{*}{\alpha}\right) \cdot \begin{bmatrix} -\cos\left(\overset{*}{\beta}\right) \cdot \sin\left(\overset{*}{\chi}\right) \sin\left(\overset{*}{\gamma} - \overset{*}{v}\right) \\ + \sin\left(\overset{*}{\beta}\right) \cdot \cos\left(\overset{*}{\chi}\right) \sin\left(\overset{*}{\theta} - \overset{*}{\lambda}\right) \end{bmatrix},$$

$$\rho u_3^{\underline{\Delta}} \stackrel{def}{=} \varphi^\dagger \underline{\Delta}^{[3]} \varphi = -\sin\left(2 \cdot \overset{*}{\alpha}\right) \cdot \begin{bmatrix} \cos\left(\overset{*}{\beta}\right) \cdot \cos\left(\overset{*}{\chi}\right) \cos\left(\overset{*}{\gamma} - \overset{*}{\lambda}\right) \\ -\sin\left(\overset{*}{\beta}\right) \cdot \sin\left(\overset{*}{\chi}\right) \cos\left(\overset{*}{\theta} - \overset{*}{v}\right) \end{bmatrix},$$

$$\rho u_4^{\underline{\Delta}} \stackrel{def}{=} \varphi^\dagger \underline{\Delta}^{[4]} \varphi = -\sin\left(2 \cdot \overset{*}{\alpha}\right) \cdot \begin{bmatrix} -\cos\left(\overset{*}{\beta}\right) \cdot \cos\left(\overset{*}{\chi}\right) \sin\left(\overset{*}{\gamma} - \overset{*}{\lambda}\right) \\ -\sin\left(\overset{*}{\beta}\right) \cdot \sin\left(\overset{*}{\chi}\right) \sin\left(\overset{*}{\theta} - \overset{*}{v}\right) \end{bmatrix}.$$

Следовательно, здесь 2-антидиагональные матрицы $\underline{\Delta}^{[1]}$ и $\underline{\Delta}^{[2]}$ определяют 2-мерное пространство $(u_1^{\underline{\Delta}}, u_2^{\underline{\Delta}})$, в котором действует преобразование изоспина. 2-антидиагональные матрицы $\underline{\Delta}^{[3]}$ и $\underline{\Delta}^{[4]}$ определяют такое же пространство $(u_3^{\underline{\Delta}}, u_4^{\underline{\Delta}})$. Эта пентада содержит единственную 2-диагональную матрицу, определяющую 1-мерное пространство $(u_0^{\underline{\Delta}})$ для размещения событий.

Подобно сладкой пентаде горькая пентада с четырьмя 2-антидиагональными матрицами и с единственной 2-диагональной матрицей определяет два 2-мерных пространства для изоспиновых преобразований и одно 1-мерное пространство для размещения событий.

9 Два события

Пусть

$$\int_{D_1} d^3 \mathbf{x} \int_{D_2} d^3 \mathbf{y} \cdot \rho(t, \mathbf{x}, \mathbf{y}) \stackrel{Def}{=} \mathbf{P}(A_1(t, D_1) \& A_2(t, D_2))$$

Существуют комплексные функции $\varphi_{s_1, s_2}(t, \mathbf{x}, \mathbf{y})$ ($s_k \in \{1, 2, 3, 4\}$), для которых:

$$\rho(t, \mathbf{x}, \mathbf{y}) = 4 \sum_{s_1=1}^4 \sum_{s_2=1}^4 \varphi_{s_1, s_2}^*(t, \mathbf{x}, \mathbf{y}) \varphi_{s_1, s_2}(t, \mathbf{x}, \mathbf{y}).$$

Если

$$\Psi(t, \mathbf{x}, \mathbf{y}) \stackrel{Def}{=} \sum_{s_1=1}^4 \sum_{s_2=1}^4 \varphi_{s_1, s_2}(t, \mathbf{x}, \mathbf{y}) (\psi_{s_1}^\dagger(\mathbf{x}) \psi_{s_2}^\dagger(\mathbf{y}) - \psi_{s_2}^\dagger(\mathbf{y}) \psi_{s_1}^\dagger(\mathbf{x})) \Phi_0,$$

то

$$\begin{aligned} & \Psi^\dagger(t, \mathbf{x}, \mathbf{y}) \Psi(t, \mathbf{x}, \mathbf{y}) = \\ & = 4 \sum_{s_1=1}^4 \sum_{s_2=1}^4 \varphi_{s_1, s_2}^*(t, \mathbf{x}', \mathbf{y}') \varphi_{s_1, s_2}(t, \mathbf{x}, \mathbf{y}) \cdot \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \delta(\mathbf{y} - \mathbf{y}'). \end{aligned}$$

Подобно (8): система с неизвестными комплексными функциями $Q_{s_1, k_1}^{(1)}$, Q_{s_2, k_2} , $Q_{s_1, k_1; s_2, k_2}^{(1,2)}$:

$$\left\{ \begin{aligned} & \sum_{k_1=1}^4 Q_{s_1, k_1}^{(1)} \varphi_{k_1, s_2} + \sum_{k_2=1}^4 Q_{s_2, k_2}^{(2)} \varphi_{s_1, k_2} + \\ & + \sum_{k_1=1}^4 \sum_{k_2=1}^4 Q_{s_1, k_1; s_2, k_2}^{(1,2)} \varphi_{k_1, k_2} = \\ & = \partial_t \varphi_{s_1, s_2} - \sum_{r=1}^3 \left(\sum_{k_1=1}^4 \beta_{s_1, k_1}^{[r]} \frac{\partial}{\partial x_r} \varphi_{k_1, s_2} + \sum_{k_2=1}^4 \beta_{s_2, k_2}^{[r]} \frac{\partial}{\partial y_r} \varphi_{s_1, k_2} \right); \\ & Q_{k_1, s_1}^{(1)*} = -Q_{s_1, k_1}^{(1)}; \\ & Q_{k_2, s_2}^{(2)*} = -Q_{s_2, k_2}^{(2)}; \\ & Q_{k_1, s_1; s_2, k_2}^{(1,2)*} = -Q_{s_1, k_1; s_2, k_2}^{(1,2)}; \\ & Q_{s_1, k_1; k_2, s_2}^{(1,2)*} = -Q_{s_1, k_1; s_2, k_2}^{(1,2)} \end{aligned} \right.$$

имеет решения.

et cetera...

10 Размерность физического пространства

Теперь пусть размерность пространства событий μ - любое натуральное число, обязательно равное 3.

По [19]: для каждого натурального числа z существует клиффордово множество ранга 2^z .

Для каждого вектора плотности вероятности $\langle \rho(t, \mathbf{x}), \mathbf{j}(t, \mathbf{x}) \rangle$ натуральное число s , клиффордово множество K ранга s и комплексный s -вектор $\overleftarrow{\varsigma}(t, \mathbf{x})$ существуют, для которых: $\gamma_n \in K$ и

$$\overleftarrow{\varsigma}(t, \mathbf{x})^\dagger \overleftarrow{\varsigma}(t, \mathbf{x}) = \rho(t, \mathbf{x}), \quad (58)$$

$$\overleftarrow{\varsigma}(t, \mathbf{x})^\dagger \gamma_n \overleftarrow{\varsigma}(t, \mathbf{x}) = j_n(t, \mathbf{x}). \quad (59)$$

В этом случае $\overleftarrow{\varsigma}(t, \mathbf{x})$ называется s -спином для $\langle \rho(t, \mathbf{x}), \mathbf{j}(t, \mathbf{x}) \rangle$.

Пусть $\rho_c(t, \mathbf{x}|t_0, \mathbf{x}_0)$ - плотность условной вероятности события $A(t, \mathbf{x})$ по событию $B(t_0, \mathbf{x}_0)$ в $\mu + 1$ пространстве-времени. И если

$$\rho_c(t, \mathbf{x}|t_0, \mathbf{x}_0) = g(t, \mathbf{x}|t_0, \mathbf{x}_0) \rho(t, \mathbf{x}),$$

то функция $g(t, \mathbf{x}|t_0, \mathbf{x}_0)$ есть функция взаимодействия для A и B в $\mu + 1$ -пространстве-времени.

Пусть ζ_c и ζ - s -спиноры, для которых: $\rho = \zeta^\dagger \zeta$ и $\rho_c = \zeta_c^\dagger \zeta_c$.

Если на этих спинорах определено произведение $\circ$ так, что для каждого ζ_c и ζ существует элемент ζ_g этой алгебры, для которого: $\zeta_c = \zeta_g \circ \zeta$ и $\zeta_g^\dagger \zeta_g = g$, то множество этих спиноров образует нормированную алгебру с делением.

Размерность такой алгебры по теореме Гурвица [3] (Каждая нормированная алгебра с единицей изоморфна одной из следующих: алгебра вещественных чисел R , алгебра комплексных чисел C , алгебра кватернионов K , или алгебра октав O) и по обобщенной теореме Фробениуса [4] (Алгебра с делением имеет размерность только 1, 2, 4 или 8) не больше, чем 8.

В этом случае размер матриц клиффордова множества не более, чем 4×4 (матрицы этого множества комплексные). Такое клиффордово множество содержит не более, чем 5 элементов. Диагональные элементы этой пентады определяют пространство событий. Размерность этого пространства не больше 3. Следовательно, в этом случае мы имеем 3+1 пространство-время.

Если $\mu > 3$, то для каждой такой алгебры существует функция взаимодействия, не принадлежащая этой алгебре. Я называю такие взаимодействия *сверхестественными* для этой алгебры взаимодействиями.

11 Интерпретация квантовой теории событиями

Здесь я продолжаю развивать идею [5], [6], [7], [8], [9] [10] интерпретации квантовой теории событиями:

Как мы видели, понятия и утверждения квантовой теории представляют понятия и утверждения о вероятностях точечных событий и их ансамблей.

Поведение физической элементарной частицы в вакууме подобно поведению этих вероятностей. В двух-щелевом эксперименте [20] если в вакууме между источником физической частицы и детектирующим экраном помещается перегородка с двумя щелями, то наблюдается интерференция вероятностей. Но если эту систему поместить в камеру Вильсона, то частица будет иметь ясную траекторию, обозначенную каплями конденсата, и всякая интерференция исчезнет. Это подобно тому, что физическая частица существует только в тот момент когда с нею случается какое-нибудь событие. В остальные времена частицы нет, а есть только вероятность того, что с нею что-нибудь случится.

Следовательно, если между событием рождения и событием детектирования с частицей не случается никаких событий, то поведение частицы - это поведение вероятности между точкой рождения и точкой детектирования; при этом наблюдается интерференция. Но в камере Вильсона, где акты ионизации образуют почти непрерывную линию, частица имеет ясную траекторию и никакой интерференции.

Эта частица движется потому, что такая линия не абсолютно непрерывна. Каждая точка ионизации имеет соседнюю ионизационную точку, и между этими точками никаких событий с частицей не происходит. Следовательно, физическая частица движется потому, что соответствующая вероятность распространяется в пространстве между этими точками.

Следовательно, частица есть ансамбль событий, связанных вероятностями. А заряды, массы, импульсы, среднее число частиц в конденсате и т.п. представляют статистические параметры волн этих вероятностей, распространяющихся в пространстве-времени. Это объясняет все парадоксы квантовой физики.

12 Заключение

Таким образом, любые физические события выражаются частицами, подобными лептонам, кваркам и калибровочным бозонам. Хиггсы не нужны.

References

- [1] G. Quznetosov, ANNALES DE LA FONDATION LOUIS DE BROGLIE Volume 29 numero Hors serie 2, (2004). Исправленная версия в <http://arxiv.org/physics/0502038>
- [2] Например, Stephanie J. Morris, The Pythagorean Theorem, The University of Georgia, Department of Mathematics Education J. Wilson, EMT 669
- [3] И. Л. Кантор, А. С. Солодовников, *Гиперкомплексные числа*, "Наука", Москва (1973), p.99
- [4] О. В. Мельников, В. Н. Ремесленников,..., *Общая алгебра*, "Наука", Москва (1990), p.396
- [5] H. Bergson, *Creative Evolution*. Greenwood press, Wesport, Conn., (1975)
- [6] A. N. Whitehead, *Process and Reality*. Ed. D. R. Griffin and D.W.Sherburne. The Free Press, N.Y. (1978)
- [7] M. Capek, *The Philosophical Impact of Contemporary Physics*. D. Van Nostrand, Princeton, N.J. (1961)
- [8] M. Capek. Particles or events. in *Physical Sciences and History of Physics*. Ed. R. S. Cohen and M. W. Wartorsky. Reidel, Boston, Mass. (1984), p.1.
- [9] E. C. Whipple jr. Nuovo Cimento A, **11**, 92 (1986)
- [10] J. Jeans, *The New Background of Science*. Macmillan, N. Y. (1933)

- [11] for instance, E. Madelung, *Die Mathematischen Hilfsmittel des Physikers*. (Springer Verlag, 1957) p.29
- [12] V. V. Dvoeglazov, *Fizika*, **B6**, No. 3, pp. 111-122 (1997). *Int. J. Theor. Phys.*, **34**, No. 12, pp. 2467-2490 (1995). *Annales de la Fondation de Louis de Broglie*, **25**, No. 1, pp. 81-91 (2000).
- [13] A. O. Barut, P. Cordero, G. C. Ghirardi, *Nuovo. Cim.* **A66**, 36 (1970). A. O. Barut, *Phys. Let.* **73B**, 310 (1978); *Phys. Rev. Let.* **42**, 1251 (1979). A. O. Barut, P. Cordero, G. C. Ghirardi, *Phys. Rev.* **182**, 1844 (1969).
- [14] R. Wilson, *Nucl. Phys.* **B68**, 157 (1974).
- [15] V. V. Dvoeglazov, Additional Equations Derived from the Ryder Postulates in the $(1/2,0)+(0,1/2)$ Representation of the Lorentz Group. hep-th/9906083. *Int. J. Theor. Phys.* **37** (1998) 1909. *Helv. Phys. Acta* **70** (1997) 677. *Fizika B* **6** (1997) 75; *Int. J. Theor. Phys.* **34** (1995) 2467. *Nuovo Cimento* **108 A** (1995) 1467. *Nuovo Cimento* **111 B** (1996) 483. *Int. J. Theor. Phys.* **36** (1997) 635.
- [16] D. V. Ahluwalia, $(j,0)+(0,j)$ Covariant spinors and causal propagators based on Weinberg formalism. nucl-th/9905047. *Int. J. Mod. Phys. A* **11** (1996) 1855.
- [17] М. В. Садовский, *Лекции по квантовой теории поля* (Институт электрофизики, УрО РАН, 2000), p.33 (2.12)
- [18] Льюис Райдер, *Квантовая теория поля*, Мир, Москва (1987), p.133, (3.136)
- [19] В. А. Желнорович, *Теория спиноров и ее приложения в физике и математике*, "Наука", Москва (1982), p.21
- [20] for instance: Mario Rabinowitz, *preprint* physics/0302062
- [21] E. C. Whipple jr. *Nuovo Cimento A*, 11, 92 (1986)
- [22] J. Jeans, *The New Background of Science*, Macmillan, N. Y. (1933)
- [23] Ph. Blanchar and A. Jadczyk *Preprint* quant-ph/9504005
- [24] Ph. Blanchar and A. Jadczyk *Preprint* quant-ph/9610028
- [25] Ph. Blanchar and A. Jadczyk *Preprint* quant-ph/9610028
- [26] Например, Г. Кейн, *Современная физика элементарных частиц*, Москва, Мир (1990)